

พาลิเพอริโดน

ความแรง 175 263 350 และ 525 มิลลิกรัม
ยาแขวนตะกอน ออกฤทธิ์นาน บรรจุในกระบอกพร้อมชนิด
ช็อกการต้า Invega Trinza™ (อินวีกา ทรินซา)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร : พาลิเพอริโดนพาลมิตเทต (paliperidone palmitate)
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร : รักษาโรคจิตเภท

2. ข้อควรระวัง

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
 - เคยแพ้ยาชื่อ ริสเพอริโดน
 - มีภาวะสมองเสื่อมและอายุมากกว่า 60 ปี
- 2.2 เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หากผู้ใช้ยานี้
- กำลังใช้ "ยา สมุนไพร อาหารเสริม" ตัวอื่นอยู่
 - เป็นหรือเคยเป็น โรคหัวใจ มีปัญหาในการทำงานของหัวใจ หรือเป็นความดันเลือดสูงที่ต้องรักษา
 - เสี่ยงต่อการเกิดลมเลือดอุดตันในร่างกาย
 - ความดันเลือดตก หมดสติ เมื่อลุกจากการนั่งหรือนอน
 - โรคพาร์กินสัน สมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์
 - โรคลมชัก ชักผิดปกติ
 - เคยมีไข้สูงร่วมกับตัวแข็งเกร็ง จากการใช้ยารักษาโรคทางจิต
 - เป็นหรือเคยเป็น ภาวะมีดเลือดขาวในเลือดต่ำ
 - เป็นหรือเคยเป็นมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่ต่อมในสมอง
 - ดื่บหรือได้ทำงานผิดปกติ
 - น้ำตาลในเลือดสูงหรือเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน
 - ระดับไขมันในเลือดสูงผิดปกติ
 - ตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ รวมถึงให้นมบุตร
 - วางแผนจะผ่าตัดตา เช่น ผ่าตัดต้อกระจก
 - อวัยวะเพศแข็งตัวนานหรือเจ็บในผู้ชาย
- " สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่ "

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- แพทย์หรือเภสัชกรจะพิจารณาขนาดยาที่ใช้
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้จัดยาให้ที่ ดับเบิ้ลหรือ สะโพก
- ฉีดยา 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน เพราะยาสามารถออกฤทธิ์ได้นาน 3 เดือน

3.2 หากลืมฉีดยาตามนัด ควรทำอย่างไร

- ติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลที่รักษา ทันทีที่นึกได้เพื่อทำการนัดวันมาฉีดยาที่ลืมให้เร็วที่สุด

3.3 ถ้าได้ยาผิดเกินขนาด ควรทำอย่างไร

- แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการผิดปกติ หรือสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากกังวลหรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ตัวแข็งเกร็ง เคลื่อนไหวลำบาก ให้รีบแจ้งแพทย์หรือประสานส่งโรงพยาบาล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและผลจากการใช้ยา
- ไปฉีดยาตามนัดและห้ามหยุดการรักษาเอง เพื่อผลการรักษาที่ดี
- การขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะเมื่อ " ง่วงซึมหรือเห็นภาพเบลอ "
- คุมกำเนิดหรือหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ระหว่างการใช้นี้ เพราะยาอาจส่งผลเสียต่อทารก
- การลุกขึ้นจากการนั่งหรือนอน อาจทำให้เกิดอาการวูบ หกล้มได้ ระวังและเปลี่ยนท่านอย่างช้า ๆ

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ปาก ลมพิษ หายใจไม่สะดวก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
 - ชาบวม ปวด ผิวหนังเป็นสีแดง
 - หายใจลำบาก เจ็บแน่นหน้าอก
 - ไข้สูง ตัวแข็งเกร็ง มึนงง ไม่รู้สึกตัวหรือสติลดลง
 - แขนขาอ่อนแรงหรือขาครึ่งซีก พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว ปวดหัวรุนแรง
 - ชัก หมดสติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- นอนไม่หลับ หลับไม่สนิท
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
- น้ำหนักเพิ่ม
- หน้ามืด วูบ เมื่อลุกจากการนั่งหรือนอน
- ง่วง ซึม มองเห็นภาพเบลอ
- ปวดหัว ไม่สบายตัว เหนื่อยเพลีย ไม่มีแรง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อากาศเย็นแสงโดยตรง ห้ามเก็บที่อุณหภูมิมากกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา น้ำยาแขวนตะกอน สีขาวถึงขาวนวล
- ตัวยาสาคัญ คือ พาลิเพอริโดน (ในรูป พาลมิตเทต) ในกระบอกฉีดยาพร้อมชนิดประกอบตัวยาลิเพอริโดนขนาด 175, 263, 350 และ 525 มิลลิกรัม (ในรูป พาลิเพอริโดน พาลมิตเทตขนาด 273, 410, 546 และ 819 มิลลิกรัม ตามลำดับ)

- ส่วนประกอบอื่น

กรดซัลฟิวริก โมโนไฮเดรต, แมคโครกอล 4000, โพลีเมอร์ เบต 20, โซเดียม

ฟอสเฟต โมโนเบสิก, โซเดียมไฮดรอกไซด์, น้ำสำหรับ ยาฉีด

ผู้ผลิต Janssen Pharmaceutica NV, Kingdom of

Belgium

นำเข้าโดยบริษัท แจนเซน-ซีแลค จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิด

จากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล

aepqjacth@its.jnj.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณา

ติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล medinfosea@its.jnj.com

โปรดอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับแพทย์ฉบับเต็มได้ทาง
เว็บไซต์

<https://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ AU CMI version JUL-

2020 (Editorial change)