

พาลิเพอริโดน

ความแรง 175 263 350 และ 525 มิลลิกรัม
ยาแขวนตะกอน ออกฤทธิ์นาน บรรจุในกระบอกพร้อมชนิด
ชื่อการค้า Invega Trinza™ (อินวีซ่า ทรีนซ่า)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร : พาลิเพอริโดนพาลมีเทต
(paliperidone palmitate)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร : รักษาโรคจิตเภท

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้ยาชื่อ ริสเพอริโดน
- มีภาวะสมองเสื่อมและอายุมากกว่า 60 ปี

2.2 เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์หากผู้ใช้ยา
มีภาวะต่อไปนี้

- กำลังใช้ "ยา สมุนไพร อาหารเสริม" ตัวอื่นอยู่
 - เป็นหรือเคยเป็น โรคหัวใจ มีปัญหาในการทำงานของหัวใจ หรือเป็นความดันเลือดสูงที่ต้องรักษา
 - เสี่ยงต่อการเกิดลมเล็ดจุดตื้นในร่างกาย
 - ความดันเลือดตก หน้ำมืด เมื่อลุกจากการนั่งหรือนอน
 - โรคพาร์กินสัน สมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์
 - โรคลมชัก ชักผิดปกติ
 - เคยมีไข้สูงร่วมกับตัวแข็งเกร็ง จากการใช้ยารักษาโรคทางจิต
 - เป็นหรือเคยเป็น ภาวะมีดเลือดขาวในเลือดต่ำ
 - เป็นหรือเคยเป็นมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่ต่อมในสมอง
 - ดื่บหรือได้ทำงานผิดปกติ
 - น้ำตาลในเลือดสูงหรือเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน
 - ระดับไขมันในเลือดสูงผิดปกติ
 - ตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ รวมถึงให้นมบุตร
 - วางแผนจะผ่าตัดตา เช่น ผ่าตัดต้อกระจก
 - อวัยวะเพศแข็งตัวนานหรือเจ็บในผู้ชาย
- " สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่ "

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- แพทย์หรือเภสัชกรจะพิจารณาขนาดยาที่ใช้
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้จัดยาให้ที่ ดันแขนหรือ สะโพก
- ฉีดยา 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน เพราะยาสามารถออกฤทธิ์ได้นาน 3 เดือน

3.2 หากลืมฉีดยาตามนัด ควรทำอย่างไร

- ติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลที่รักษา ทันทีที่นึกได้เพื่อทำการนัดวันมาฉีดยาที่ลืมให้เร็วที่สุด

3.3 ถ้าได้ยาฉีดเกินขนาด ควรทำอย่างไร

- แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการผิดปกติ หรือสังเกตอาการอย่างไรก็ตาม หากกังวลหรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ตัวแข็งเกร็ง เคลื่อนไหวลำบาก ใหรีบแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรโรงพยาบาล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและผลจากการใช้ยา
- ไปฉีดยาตามนัดและห้ามหยุดการรักษาเอง เพื่อผลการรักษาที่ดี
- การขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะเมื่อ "ง่วงซึมหรือเห็นภาพเบลอล"
- คุมกำเนิดหรือหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ระหว่างการใช้อยานี้ เพราะยาอาจส่งผลเสียต่อทารก
- การลุกขึ้นจากการนั่งหรือนอน อาจทำให้เกิดอาการวูบ หกล้มได้ ระวังและเปลี่ยนท่านอย่างช้า ๆ

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ปาก ลมพิษ หายใจไม่สะดวก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- ชาบวม ปวด ผิวหนังเป็นสีแดง
- หายใจลำบาก เจ็บแน่นหน้าอก
- ไข้สูง ตัวแข็งเกร็ง มึนงง ไม่รู้สึกตัวหรือสติลดลง
- แขนขาอ่อนแรงหรือขาครึ่งซีก พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว ปวดหัวรุนแรง
- ชัก หมดสติ

5.2 อาการที่เกิดบ่อยไม่ต้องรีบไปพบแพทย์หากไม่รุนแรง

- นอนไม่หลับ หลับไม่สนิท
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
- น้ำหนักเพิ่ม
- หน้ามืด วูบ เมื่อลุกจากการนั่งหรือนอน
- ง่วง ซึม มองเห็นภาพเบลอล
- ปวดหัว ไม่สบายตัว เหนื่อยเพลีย ไม่มีแรง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อยาให้โดนแสงโดยตรง ห้ามเก็บที่อุณหภูมิมากกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

นำเข้าโดยบริษัท แจนเซน-ซีแลค จำกัด กรุงเทพฯ
ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิด
จากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล
aepqjacth@its.jnj.com
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณา
ติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล medinfosea@its.jnj.com

โปรดอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับแพทย์ฉบับเต็มได้ทาง
เว็บไซต์

<https://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 20 มีนาคม 2567