

อีลีทริปแทน
ความแรง 40 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า RELPAX™ (เรลแพ็กซ์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า อี-ลี-ทริป-แทน (Eletriptan) มีตัวยา 40 มิลลิกรัม

2.1. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบเฉียบพลัน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ยานี้ห้ามใช้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- การทำงานของตับหรือไตบกพร่องอย่างรุนแรง
- มีภาวะความดันโลหิตสูงปานกลางถึงรุนแรง หรือมีภาวะความดันโลหิตสูงที่ยังไม่ได้รับการรักษา
- มีโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
- เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
- ได้รับยาเออร์โกตามีน ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
- กำลังใช้ยารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนตัวอื่นที่มีชื่อลงท้ายด้วยคำว่า "ทริปแทน" เช่น ซูมาทริปแทน นาราทริปแทน

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์ เมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคเบาหวาน
- สูบหรี่หรือกำลังใช้สารนิโคตินทดแทนเพื่อเลิกบุหรี่
- ไม่แน่ใจว่าเป็นโรคหัวใจ หรือมีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น เป็นเพศชายอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือเป็นเพศหญิงวัยหมดประจำเดือน หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

"สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่"

3. วิธีใช้ยา

3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ขนาดยาโดยทั่วไป คือ กินครั้งละ 1 เม็ด เมื่อมีอาการ
- กลืนยาทั้งเม็ด พร้อมดื่มน้ำตาม
- หากกินยาเม็ดแรกแล้วอาการปวดศีรษะบรรเทาลงหรือหายไป และกลับมามีอาการปวดซ้ำอีกครั้ง สามารถกินยาซ้ำได้หลังจากกินยาเม็ดแรกไปแล้วอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- ไม่ควรกินยานี้เกิน 2 เม็ดภายใน 24 ชั่วโมง
- หากกินยาเม็ดแรกแล้วอาการปวดศีรษะไม่บรรเทาลง ให้แจ้งแพทย์เพื่อพิจารณาปรับขนาดยา
- ไม่ควรกินยานี้เพื่อป้องกันไมเกรน

3.2. ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมกับยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ของยานี้ หากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังจากใช้ยานี้ เนื่องจากยานี้หรืออาการของปวดศีรษะไมเกรนเองอาจจะทำให้ง่วงซึมได้
- หลีกเลี่ยงนมบุตร ควรดื่มนมบุตรหลังจากกินยานี้ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1. อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง
- เจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ
- กระสับกระส่าย ประสาทหลอน สูญเสียการทรงตัว หัวใจเต้นเร็ว อุณหภูมิร่างกายเพิ่มสูงขึ้น ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2. อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ใจสั่น เวียนหัว บ้านหมุน ปวดหัว
 - ง่วงซึม ความรู้สึกจากการสัมผัสลดลง
 - เจ็บคอ แน่นคอ ปากแห้ง
 - ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้
 - กล้ามเนื้อตึงตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ
 - รู้สึกอ่อนแรง รู้สึกร้อน หน้าแดง หนาวสั่น น้ำมูกไหล เหงื่อออก รู้สึกซ่าหรือความรู้สึกผิดปกติ
- "ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"**

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีส้ม รูปกลม นูน ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "REP 40" อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร "VLE"
- **ตัวยาสำคัญ** คือ อีลีทริปแทน
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส (microcrystalline cellulose) แลคโตสโมโนไฮเดรต (lactose monohydrate) ครอสคาเมลโลสโซเดียม (croscarmellose sodium) แมกนีเซียมสเตียเรต (magnesium stearate) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide) ไฮโปรมेलโลส (hypromellose) กลีเซอรอลไตรอะซิเตต (glycerol triacetate) และซันเซต เยลโลวอลูมิเนียมเลค (sunset yellow aluminum lake)

ผู้ผลิต Pfizer Italia S.r.l., Italy

ผู้นำเข้า บริษัท เวียร์ทริส (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 18 มกราคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร