

**ด็อกซาโซซินเมซึเลด**  
**ขนาด 1, 2 และ 4 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ด**  
**ชื่อการค้า Cardura™ (คาร์ดูรา™)**

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ด็อก-ซา-โซ-ซิน-เม-ซึ-เลด (doxazosin mesylate) มีตัวยา 1, 2 หรือ 4 มิลลิกรัม
- เป็นยาในกลุ่ม อัลฟา-บล็อกเกอร์

#### 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง
- ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโต

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1. ยานี้ห้ามใช้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ ส่วนประกอบของยานี้ หรือยาในกลุ่มควินาโซลิน
- มีโรคต่อมลูกหมากโตร่วมกับความดันโลหิตต่ำ
- เคยมีภาวะความดันโลหิตต่ำเมื่อมีการเปลี่ยนท่า
- มีโรคต่อมลูกหมากโตร่วมกับทางเดินปัสสาวะอุดตัน มีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ หรือติดเชื้ในทางเดินปัสสาวะ
- ไม่สามารถกลืนปัสสาวะได้หรือปัสสาวะออกน้อย

#### 2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์เมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคตับ
- มีโรคหัวใจ
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร  
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยาในเวลาที่เดียวกันของทุกวัน
- ยานี้สามารถกินตอนท้องว่างหรือพร้อมกับมื้ออาหารก็ได้

#### 3.2. ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้ข้ามยาเม็ดที่ลืมไปกินยาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

#### 3.3. ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมกับยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ของยานี้ หากมีอาการผิดปกติ

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังจากใช้ยานี้ โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังการเริ่มยา เนื่องจากยานี้อาจจะทำให้อ่อนเพลียหรือเวียนศีรษะ
- หากมีอาการหน้ามืดหรือจะเป็นลม ให้นั่งหรือนอนพัก จนกว่าอาการจะดีขึ้น
- แจ้งแพทย์ของท่านว่ากำลังใช้ยานี้ หากท่านกำลังจะเข้ารับการรักษาตัวกรจะ

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1. อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด พูดลำบาก พูดไม่ออก ซึ่งอาจเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมอง
- เจ็บแน่นหน้าอก ใจสั่น หัวใจวาย
- ตัวเหลือง ตาเหลือง
- อวัยวะเพศแข็งตัวค้างและมีอาการปวด

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

#### 5.2. อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- เวียน ปวดหัว เวียนหัวบ้านหมุน
  - เหนื่อย ซ้อเท้า นิ้วบวม
  - ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องผูก อาหารไม่ย่อย ปากแห้ง
  - คัดจมูก ไอ น้ำมูกไหล ติดเชื้ในทางเดินหายใจ
  - ติดเชื้ในทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กลั้นปัสสาวะไม่ได้
  - สมรรถภาพทางเพศลดลง
  - ปวดหลัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

### 6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

#### • ลักษณะยา

- ขนาด 1 มิลลิกรัม : เม็ดกลมนูน สีขาว ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "CN 1" อีกด้านมีตัวอักษร "VLE"
- ขนาด 2 มิลลิกรัม : เม็ดยาวนูน ปลายมน สีขาว ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "CN" และเลข 2 อีกด้านมีตัวอักษร "VLE"
- ขนาด 4 มิลลิกรัม : เม็ดสี่เหลี่ยมขมมเบี้ยกปุ่น นูน สีขาว ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "CN" และเลข 4 อีกด้านมีตัวอักษร "VLE"

- **ตัวยาสำคัญ** คือ ด็อกซาโซซินเมซึเลด 1, 2 หรือ 4 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต (sodium starch glycolate) ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส (microcrystalline cellulose) แลคโทส (lactose) แมกนีเซียมสเตียเรต (magnesium stearate) โซเดียมลอริลซัลเฟต (sodium lauryl sulfate) ผู้ผลิต Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Germany ผู้นำเข้า บริษัท เวียร์ทริส (ประเทศไทย) จำกัด เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 6 กันยายน 2567 ดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก URL "<http://ndi.fda.moph.go.th>"

PIL Revision no: 1.6

PIL date: September 06, 2024

Country: Thailand