

ด็อกซาโซซินเมซิโลด
ขนาด 1, 2 และ 4 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า Cardura™ (คาร์ดูรา™)

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ด็อก-ซา-โซ-ซิน-เม-ซี-เลด (doxazosin mesylate) มีตัวยา 1, 2 หรือ 4 มิลลิกรัม
- เป็นยาในกลุ่ม อัลฟา-บล็อกเกอร์

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง
- ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโต

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ยานี้ห้ามใช้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ ส่วนประกอบของยานี้ หรือยาในกลุ่มควินาโซลีน
- มีโรคต่อมลูกหมากโตร่วมกับความดันโลหิตต่ำ
- เคยมีภาวะความดันโลหิตต่ำเมื่อมีการเปลี่ยนท่า
- มีโรคต่อมลูกหมากโตร่วมกับทางเดินปัสสาวะอุดตัน มีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ หรือติดเชื้ในทางเดินปัสสาวะ
- ไม่สามารถกลืนปัสสาวะได้หรือปัสสาวะออกน้อย

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์เมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคตับ
- มีโรคหัวใจ
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยานี้ในเวลาเดียวกันของทุกวัน
- ยานี้สามารถกินตอนท้องว่างหรือพร้อมกับมื้ออาหารก็ได้

3.2. ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้ข้ามยาเม็ดที่ลืมไปกินยาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3. ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมกับยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ของยานี้ หากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังจากใช้ยานี้ โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังการเริ่มยา เนื่องจากยานี้อาจจะทำให้อ่อนเพลียหรือวิงเวียนได้
- หากมีอาการหน้ามืดหรือจะเป็นลม ให้นั่งหรือนอนพัก จนกว่าอาการจะดีขึ้น
- แจ้งแพทย์ของท่านว่ากำลังใช้ยานี้ หากท่านกำลังจะเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1. อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนึ่งหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด พูดลำบาก พูดไม่ออก ซึ่งอาจเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมอง
- เจ็บแน่นหน้าอก ใจสั่น หัวใจวาย
- ตัวเหลือง ตาเหลือง
- อวัยวะเพศแข็งตัวค้างและมีอาการปวด

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2. อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- วิงเวียน ปวดหัว เวียนหัวบ้านหมุน
 - เท้า ข้อเท้า นิ้วบวม
 - ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องผูก อาหารไม่ย่อย ปากแห้ง
 - คัดจมูก ไอ น้ำมูกไหล ติดเชื้ในทางเดินหายใจ
 - ติดเชื้ในทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กลั้นปัสสาวะไม่ได้
 - สมรรถภาพทางเพศลดลง
 - ปวดหลัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาน้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

• ลักษณะยา

ขนาด 1 มิลลิกรัม : เม็ดกลมนูน สีขาว ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "CN 1" อีกด้านมีสัญลักษณ์ Pfizer
ขนาด 2 มิลลิกรัม : เม็ดยาวนูน ปลายมน สีขาว ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "CN" และเลข 2 อีกด้านมีสัญลักษณ์ Pfizer
ขนาด 4 มิลลิกรัม : เม็ดสี่เหลี่ยมขนมเบียกปูน นูน สีขาว ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "CN" และเลข 4 อีกด้านมีสัญลักษณ์ Pfizer
• **ตัวยาสำคัญ** คือ ด็อกซาโซซินเมซิโลด 1, 2 หรือ 4 มิลลิกรัม
• **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต (sodium starch glycolate) ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส (microcrystalline cellulose) แลคโทส (lactose) แมกนีเซียมสเตียเรต (magnesium stearate) โซเดียมลอริลซัลเฟต (sodium lauryl sulfate)
ผู้ผลิต Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Germany
ผู้นำเข้า บริษัท เวียร์ทริค (ประเทศไทย) จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 5 มีนาคม 2567
ดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก URL "<http://ndi.fda.moph.go.th>"

PIL Revision no: 1.5

PIL date: March 05, 2024

Country: Thailand