

กาบาเพนติน
ความแรง 100, 300, 400 มิลลิกรัม
ชนิด แคปซูล
ความแรง 600 มิลลิกรัม
ชนิด เม็ด
ชื่อการค้า Neurontin™ (นิวรอนติน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่ากาบาเพนติน (gabapentin) อยู่ในกลุ่มยากันชัก

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อรักษาโรคลมชักแบบเฉพาะที่ร่วมกับมีและไม่มีอาการชักทั่วร่างกาย
- เพื่อใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษาอาการชัก
- เพื่อบรรเทาอาการปวดปลายประสาท

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบอื่นในสูตรตำรับ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ในกรณีต่อไปนี้เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้นหรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น เช่น
 - เป็นโรคไตหรืออยู่ระหว่างการฟอกไต
 - มีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าหรือเคยมีอาการผิดปกติทางจิต
 - ปวดกล้ามเนื้อ
 - อ่อนเพลีย
 - ปวดท้องตลอดเวลา
- แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
 - หญิงมีครรภ์
 - หญิงให้นมบุตร
 - เคยมีประวัติใช้ยาในทางที่ผิด หรือเคยติดยาเสพติด เพราะท่านอาจมีความเสี่ยงในการติดยา กาบาเพนตินได้

- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาแคลเซียมเฟอโดออล • ยาออลิสแตท • ยาลดกรด • อีฟนิ่งพริมโรส • แปะก๊วย • ยา มอร์ฟิน • ยา กลุ่ม opioid

3. วิธีใช้ยา

3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนยาทั้งเม็ดพร้อมกับดื่มน้ำตามมาก ๆ โดยอาจกินพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการผลัดตกจากที่สูงเพราะยานี้ อาจทำให้มีมึนงงหรือง่วงนอนได้
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา เพราะยานี้ อาจเพิ่มอาการซึมเศร้าและทำให้มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย ให้ปรึกษาแพทย์ทันทีเมื่อเริ่มมีความรู้สึก ซึมเศร้าหรืออยากทำร้ายตัวเอง
- ผู้หญิงที่สามารถมีลูกได้ต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ลมพิษ ผื่นร่วง
- หน้ามืด เป็นลม แขนและเจ็บหน้าอก หายใจลำบาก

- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - บัสสาวะผิดปกติ เช่น บัสสาวะบ่อย มีเลือดออกสีขุ่น อุจจาระสีผิดปกติ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ความอยากอาหารลดลง ผิวและตาซีเหลือง มีไข้
 - ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ รักแร้ ขาหนีบบวม
 - การเคลื่อนไหวผิดปกติ น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 - พฤติกรรมหรืออารมณ์ผิดปกติ ทำร้ายร่างกายตนเอง ซึมเศร้า
- ### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที
- มึนงง ง่วงนอน อ่อนล้า
 - บวมที่แขน ขา

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บยาแคปซูลที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส และยาเม็ดที่อุณหภูมิห้อง 20 ถึง 25 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา**
 - 100 มิลลิกรัม:** แคปซูลสีขาว มีตัวอักษรสีฟ้า "Neurontin" บนเปลือกแคปซูล และตัวอักษรสีฟ้า "100 mg" บนตัวแคปซูล
 - 300 มิลลิกรัม:** แคปซูลสีเหลือง มีตัวอักษรสีเทา "Neurontin" บนเปลือกแคปซูล และตัวอักษรสีเทา "300 mg" บนตัวแคปซูล
 - 400 มิลลิกรัม:** แคปซูลสีส้ม มีตัวอักษรสีเทา "Neurontin" บนเปลือกแคปซูล และตัวอักษรสีเทา "400 mg" บนตัวแคปซูล
 - 600 มิลลิกรัม:** เม็ดยาเคลือบฟิล์มยาวรี นูน ปลายมน สีขาว มีขีดแบ่งครึ่งเม็ดตรงกลางทั้งสอง

ด้าน ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "NT" อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร "16"

- **ตัวยาสำคัญ** กาบามาเพนติน (gabapentin)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ชนิดแคปซูล:**
lactose, corn starch, talc
ชนิดเม็ด: poloxamer 407, copolyvidone, cornstarch, magnesium stearate, talc, hydroxypropyl cellulose, candelilla wax

ผู้ผลิต VIATRIS PHARMACEUTICALS LLC, Puerto Rico

ผู้นำเข้า บ. เวียร์ทริส (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 17 ตุลาคม 2567

ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากURL "<https://ndi.fda.moph.go.th>"

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

คำเตือน (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข)

1. ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และไม่ควรถู่มสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ขณะใช้ยานี้
2. ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด
3. ห้ามใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์เพราะอาจทำให้ทารกพิการได้
4. ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต