

ซีลีค็อกซิบ
ความแรง 200 และ 400 มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล
ชื่อการค้า Celebrex™ (ซีลีเบริกซ์™)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า ซี-ลี-ค็อก-ซิบ (celecoxib) มีตัวยา 200 หรือ 400 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่ม ยาด้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs)
- 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- เพื่อบรรเทาอาการของโรคข้อเสื่อม โรคข้อสันหลังอักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
 - ใช้รักษาอาการปวดเฉียบพลัน อาการปวดประจำเดือน
 - ใช้รักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1. ยานี้ห้ามใช้เมื่อไหร่**
- เคยแพ้ยานี้ ส่วนประกอบของยานี้ หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ตัวอื่น หรือยาแอสไพริน
 - เคยแพ้ยาในกลุ่มซัลโฟนาไมด์
 - มีแผลในกระเพาะอาหาร เลือดออกในทางเดินอาหาร หรือโรคลำไส้อักเสบ
 - มีการทำงานของตับหรือไตบกพร่องอย่างรุนแรง
 - มีโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หรือเพิ่งได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
 - ตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
 - เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- 2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์เมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้**
- เคยมีเลือดออกหรือมีแผลในทางเดินอาหาร
 - อายุมากกว่า 65 ปี
 - มีการทำงานของตับหรือไตบกพร่อง
 - มีโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ หรือมีภาวะน้ำตาลในร่างกายน
 - มีภาวะขาดน้ำ เช่น ท้องเสีย หรือใช้ยาขับปัสสาวะ
 - กำลังได้รับการรักษาโรคติดเชื้อ
 - ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่
- “สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีใช้ยา

- 3.1. ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - ขนาดยาโดยทั่วไปคือ 200-400 มิลลิกรัมต่อวัน หรือตามแพทย์สั่ง
 - ในกรณีที่ไม่สามารถกลืนแคปซูลยาได้ สามารถแกะยาในแคปซูลโรยลงบนอาหารกึ่งเหลว (เช่น โยเกิร์ต โจ๊ก) ปริมาณ 1 ช้อนชา เพื่อช่วยในการกินยาได้
 - ห้ามบดหรือเคี้ยวเม็ดยาเล็กๆ ที่อยู่ในแคปซูล
- 3.2. ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร**
- กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับการกินยาครั้งถัดไป ให้ข้ามไปกินยาในครั้งถัดไป
 - ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า
- 3.3. ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมกับยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ของยานี้หากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและอาการอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
- หลีกเลี่ยงการขับชี่ยานพาหนะ หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังจากใช้ยานี้ เนื่องจากยานี้อาจจะทำให้เวียนหัว หรือง่วงนอนได้
- ควรใช้ยาในขนาดต่ำที่สุดที่บรรเทาอาการปวดได้และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ยกเว้นในกรณีที่แพทย์แนะนำ
- ไม่มียานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
<http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง มีไข้ มีอาการคล้ายเป็นหวัด
 - เจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอาการของโรคหัวใจ
 - ปวดท้องอย่างรุนแรง อุจจาระเป็นสีดำหรืออาเจียนเป็นเลือด ซึ่งอาจเป็นอาการของเลือดออกในทางเดินอาหาร
 - อาการของตับวาย เช่น คลื่นไส้ ท้องเสีย ดีซ่าน (ตัวเหลือง ตาเหลือง)
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**
- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**
- มีน้ำมูก ปวดหัว นอนไม่หลับ
 - ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย
 - ชาบวม
- “เป็นอาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา**
- ความแรง 400 มิลลิกรัม แคปซูลสีขาวขุ่น มีแถบสีเขียวที่ปลอกและตัวแคปซูล มีตัวเลข 7767 และ 400 สีขาวบนแถบ ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงขาวออกสีเหลืองอ่อน
 - ความแรง 200 มิลลิกรัม แคปซูลสีขาวขุ่น มีแถบสีทองที่ปลอกและตัวแคปซูล มีตัวเลข 7767 และ 200 สีขาวบนแถบ ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงขาวออกสีเหลืองอ่อน
- ตัวยาสำคัญ** คือ ซีลีค็อกซิบ 200 หรือ 400 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ แลคโตสโมโนไฮเดรต (lactose monohydrate) โซเดียมลอลริลซัลเฟต (sodium lauryl sulfate) โพลีไวดอน (polyvidone) โครสคาเมลโลสโซเดียม (croscarmellose sodium) แมกนีเซียมสเตียเรต (magnesium stearate)
- เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 6 มีนาคม 2567**
ผู้ผลิต Viatrix Pharmaceuticals LLC, Puerto Rico
ผู้นำเข้า บริษัท เวียร์ทริค (ประเทศไทย) จำกัด

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ สตรีมีครรภ์ และสตรีระยะให้นมบุตร
2. ห้ามใช้ในผู้ที่ได้รับการผ่าตัด หลอดเลือดหัวใจในระยะเวลาหลังผ่าตัดใหม่ๆ (immediately postoperative period)
3. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมอง
4. หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผื่นแดง หรือมีอาการคล้ายเป็นหวัดให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที
5. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้และผู้ที่มีประวัติแพ้ยาในกลุ่ม sulfonamide
6. เมื่อใช้ยานี้หากมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น ไข้ ผื่นแดง ตุ่มน้ำพอง มีการหลุดลอกของผิวหนังและบริเวณเยื่อต่างๆเช่น ในช่องปาก คอจมูกอวัยวะสืบพันธุ์ และเยื่อตาอักเสบ ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์ เพราะอาจเป็น Stevens- Johnson syndrome
7. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง (congestive heart failure NYHA II-IV)
8. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน หรือเคยมีภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตอัน เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง
9. ระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น ความดันโลหิตสูงระดับไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ผู้สูบบุหรี่ผู้สูงอายุ เป็นต้น
10. ระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต