

**ซิลденаฟิล**  
**ความแรง 25, 50 และ 100 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม**  
**ชื่อการค้า VIAGRA® (ไวอากร้า®)**

### 1. ยา นี้ คือ อะไร

#### 1.1. ยา นี้ มี ชื่อ ว่า อะไร

- ยา นี้ มี ชื่อ ว่า ซิล-เด-นา-ฟิล (Sildenafil) มี ตัวยาคือ 25, 50 หรือ 100 มิลลิกรัม
- เป็น ยา ใน กลุ่ม ยา ขยาย หลอด เลือด

#### 1.2. ยา นี้ ใช้ เพื่อ อะไร

- ใช้ รักษา อาการ อวัยวะ เพศ ชาย ไม่ แข็ง ตัว

### 2. ข้อควรระวัง ก่อน ใช้ ยา

#### 2.1. ยา นี้ ห้าม ใช้ เมื่อ ไหน

- เคย แพ้ ยา นี้ หรือ ส่วน ประกอบ ของ ยา นี้
- กำลัง ใช้ ยา รักษา อาการ เจ็บ หน้าอก จาก โรค หัวใจ (ยา ใน กลุ่ม ไนเตรต หรือ ยา ใน กลุ่ม ไนตริก ออกไซด์)
- กำลัง ใช้ ยา รักษา โรค ความดัน ใน หลอด เลือด แดง ปอด สูง
- กำลัง ใช้ ยา รักษา โรค หายใจ สมรรถภาพ ทาง เพศ ตัว อื่น อยู่
- มี โรค หัวใจ อย่าง รุนแรง
- เพิ่ง มี โรค หลอด เลือด สมอง หัวใจ วาย หรือ ภาวะ ความดัน โลหิต ต่ำ
- ความ ผิด ปกติ เกี่ยวกับ ดวงตา
- เป็น โรค ตับ หรือ โรค ไต
- ห้าม ใช้ ยา นี้ ใน เด็ก และ สตรี

#### 2.2. ข้อควรระวัง เพื่อ ความปลอดภัย ให้ บอก แพทย์ เมื่อ ท่าน มี ภาวะ ต่อไปนี้

- มีความ ผิด ปกติ เกี่ยวกับ ระบบ เลือด มะเร็ง เม็ด เลือด หรือ มะเร็ง ไช กระดูก
- มีความ ผิด ปกติ ของ องค ขาด
- มี แผล ใน กระเพาะ อาหาร หรือ เลือด ออก ใน กระเพาะ อาหาร
- มี โรค หัวใจ
- ใช้ ยา สมุนไพรร หรือ อาหาร เสริม อื่น อยู่

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร  
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่**

### 3. วิธี ใช้ ยา

#### 3.1. ขนาด และ วิธี ใช้

- ควร ใช้ ยา ตาม คำ แนะนำ ของ แพทย์ หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะ ขนาด ยา และ ระยะเวลา ใน การ ใช้ ยา นี้ ขึ้น อยู่ กับ ชนิด และ ความ รุนแรง ของ โรค
- กิน ยา นี้ ก่อน มี เพศ สัมพันธ์ ประมาณ 1 ชั่วโมง
- กิน ยา นี้ ไม่ เกิน วัน ละ 1 ครั้ง
- ยา นี้ สามารถ กิน ตอน ท้อง ว่าง หรือ พร้อม กับ มื้อ อาหาร ก็ได้

#### 3.2. ถ้า กิน ยา นี้ เกิน ขนาด ที่ แนะนำ ควร ทำ อย่างไร

- ให้ สังเกต อาการ อย่าง ใกล้ชิด และ รีบ ไป โรงพยาบาล พร้อม กับ ยา นี้ หรือ บรรจุภัณฑ์ ของ ยา นี้ หาก มี อาการ ผิด ปกติ

### 4. ข้อควรปฏิบัติ ระหว่าง ใช้ ยา

- พบ แพทย์ ตาม นัด อย่าง สม่า เสมอ เพื่อ ติดตาม ผล การ รักษา หรือ อันตราย จาก ยา
- หลีกเลี่ยง การ ขับ ขี่ ยาน พาหนะ หรือ การ ทำงาน เกี่ยวกับ เครื่องจักร หลัง จาก ใช้ ยา นี้ เนื่องจาก ยา นี้ อาจ จะ ทำให้ เวียน หัว หรือ รบกวน การ มอง เห็น ได้
- หลีกเลี่ยง การ ดื่ม แอลกอฮอล์ ใน ปริมาณ มาก ก่อน ใช้ ยา เนื่องจาก อาจ ทำให้ ยา ไม่ สามารถ ออกฤทธิ์ ได้ เต็ม ที่
- หาก รู้สึก ว่า ผล ของ ยา แรง หรือ อ่อน ใจ ไป ให้ ไป รักษา แพทย์ ห้าม ปรับ ขนาด ยา ด้วย ตน เอง
- ยา นี้ ไม่ ใช้ ยา กระตุ้น อารมณ์ ทาง เพศ
- ถ้า ใช้ ยา นี้ แล้ว มี อาการ เจ็บ หน้าอก ห้าม ใช้ ยา ใน กลุ่ม ไนเตรต เพื่อ รักษา อาการ เจ็บ หน้าอก

### 5. อันตราย ที่ อาจ เกิด จาก ยา

#### 5.1 อาการ ที่ ต้อง รีบ ไป พบ แพทย์ ทันที

- บวม ที่ ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนัง หลุดลอก มี จ้ำตาม ผิวหนัง
- เจ็บ แน่น หน้าอก ใจ สั่น หัวใจ เต้น ผิด ปกติ เหงื่อ ออก มาก รู้สึก จะเป็น ลม
- ปวด กระดู ก
- อวัยวะ เพศ แข็ง ตัว ค้าง (เกินกว่า 4 ชั่วโมง) และมี อาการ ปวด
- สูญเสีย การ มอง เห็น
- ชัก

**“ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”**

### 5.2 อาการ ที่ ถ้า มี อาการ รุนแรง ให้ ไป พบ แพทย์

- ปวด หัว เวียน หัว หน้า แดง ร้อน วูบ วาบ
- คลื่นไส้ อาหาร ไม่ ย่อย
- การ มอง เห็น หรือ การ ได้ยิน เปลี่ยน แปลง ไป
- ปวด แขน หรือ ขา
- ปวด ตา ตา แดง คัด จมูก เลือด กำ เตา ไหล

**“ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”**

### 6. ควร เก็บ ยา นี้ อย่างไร

- เก็บ ยา ใน บรรจุภัณฑ์ เดิม ตาม ที่ ได้ รับ มา
- เก็บ ยา ใน ที่ แห้ง อากาศ เย็น โดย ตรง ควร เก็บ ที่ อุณหภูมิ ไม่ เกิน 30 องศา เซลเซียส ไม่ ควร เก็บ ยา ใน ที่ ร้อน หรือ ชื้น เช่น ใน รถ ห้อง ครัว
- เก็บ ยา ให้ ห่าง จาก เด็ก

### 7. ลักษณะ และ ส่วน ประกอบ ของ ยา

- **ลักษณะ ยา** เม็ด รูป สี เหลี่ยม ขนบ เปียก ปูนูน เคลือบ ฟิล์ม สี ฟา ด้าน หนึ่ง มี ตัว อักษร VIAGRA ความ แรง 25 มิลลิกรัม อีก ด้าน หนึ่ง มี ตัว อักษร “VGR25” ความ แรง 50 มิลลิกรัม อีก ด้าน หนึ่ง มี ตัว อักษร “VGR50” ความ แรง 100 มิลลิกรัม อีก ด้าน หนึ่ง มี ตัว อักษร “VGR100”
- **ตัวยาคือ** ซิลเดนาฟิล ความ แรง 25, 50 หรือ 100 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส (microcrystalline cellulose) แคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (calcium hydrogen phosphate) ครอสคาเมลโลสโซเดียม (croscarmellose sodium) แมกนีเซียมสเตียเรต (magnesium stearate) ไฮโปรมีลโลส (hypromellose) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide) แล็กโตส (lactose)

ผู้ผลิต Fareva Amboise, France

ผู้นำเข้า บริษัท เวียร์ทริส (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 01 เมษายน 2567

**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร**

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ยานี้ไม่ใช่ยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
2. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่ เป็นโรคหัวใจ ที่ใช้ยาขยายหลอดเลือดกลุ่มไนเตรต เพราะอาจถึงตายได้
3. ห้ามใช้ยานี้ในเด็กและสตรี ผู้ที่เป็นโรคตับ หรือโรคไต
4. ห้ามใช้ยาเกินวันละ 1 ครั้ง
5. ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาโรคหอยอนสมรรถภาพทางเพศอื่น ๆ
6. หากมีอาการผิดปกติเช่น ความผิดปกติทางสายตา ปวดกระดูก เจ็บ หน้าอกใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ เหงื่อออกมากเหนื่อยเป็นลม ให้รีบพบแพทย์ทันที

PIL Revision no: 2.5

PIL date: April 01, 2024

Reference: PI rev.no. 2.3

Country: Thailand