

## กาบาเพนติน ความแรง 300 มิลลิกรัม ชนิด แคปซูล ชื่อการค้า Neugaba™ (นิวกาบา)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่ากาบาเพนติน (gabapentin) อยู่ในกลุ่มยากันชัก

#### 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อใช้รักษาโรคลมชักแบบเฉพาะที่ร่วมกับมีและไม่มีอาการชักทั่วร่างกาย
- เพื่อใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษาอาการชัก
- เพื่อบรรเทาอาการปวดปลายประสาท

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบอื่นในสูตรตำรับ

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ในกรณีต่อไปนี้เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้นหรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น เช่น
  - เป็นโรคไตหรืออยู่ระหว่างการฟอกไต
  - มีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าหรือเคยมีอาการผิดปกติทางจิต
  - ปวดกล้ามเนื้อ
  - อ่อนเพลีย
  - ปวดท้องตลอดเวลา
- แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
  - หญิงมีครรภ์
  - หญิงให้นมบุตร
  - เคยมีประวัติใช้ยาในทางที่ผิด หรือเคยติดยาเสพติด เพราะท่านอาจมีความเสี่ยงในการติดยา กาบาเพนตินได้

- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้เช่น ยาคาลซีเฟอโดอล • ยาออลิสแตท • ยาลดกรด • อีฟนิ่งพริมโรส • แปะก๊วย • ยา มอร์ฟีน • ยาากลุ่ม opioid

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนยาทั้งเม็ดพร้อมกับดื่มน้ำตามมาก ๆ โดยอาจกินพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้

#### 3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการผลัดตกจากที่สูงเพราะยานี้อาจทำให้มีมึนงงหรือวงงนอนได้
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา เพราะยานี้อาจเพิ่มอาการซึมเศร้าและทำให้มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย ให้ปรึกษาแพทย์ทันทีเมื่อเริ่มมีความรู้สึกซึมเศร้าหรืออยากทำร้ายตัวเอง
- ผู้หญิงที่สามารถมีลูกได้ต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ลมพิษ ผื่นร่วง

- หน้ามืด เป็นลม แน่นและเจ็บหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
  - บัสสาวะผิดปกติ เช่น บัสสาวะบ่อย มีเลือดออกสีขุ่น อุจจาระสีผิดปกติ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ความอยากอาหารลดลง ผิวและตาซีเหลือง มีไข้
  - ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ รักแร้ ขาหนีบบวม
  - การเคลื่อนไหวผิดปกติ นำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  - พฤติกรรมหรืออารมณ์ผิดปกติ ทำร้ายร่างกายตนเอง ซึมเศร้า
- #### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที
- มึนงง ง่วงนอน อ่อนล้า
  - บวมที่แขน ขา

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องนำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา
  - 300 มิลลิกรัม: แคปซูลสีเหลือง มีตัวอักษรสีฟ้า "G" บนปลอกแคปซูล และตัวเลขสีฟ้า "5027" ในบนตัวแคปซูล
- ตัวยาสำคัญ กาบาเพนติน (gabapentin)
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่: lactose, corn starch, talc

ผู้ผลิต VIATRIS PHARMACEUTICALS LLC, Puerto Rico

ผู้นำเข้า บ. เวียร์ทริค เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

**เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 01 เมษายน 2567**

ดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก URL

["https://ndi.fda.moph.go.th"](https://ndi.fda.moph.go.th)

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**คำเตือน (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข)**

- ยานี้อาจทำให้วังงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และไม่ควรดื่มสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ขณะใช้ยานี้
- ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด
- ห้ามใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์เพราะอาจทำให้ทารกพิการได้
- ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต