

## ซีลีค็อกซิบ

ความแรง 200 และ 400 มิลลิกรัม

ชนิดแคปซูล

ชื่อการค้า Cebrex™ (ซีเบริกซ์™)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ซี-ลี-ค็อก-ซิบ (celecoxib) มีตัวยา 200 หรือ 400 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่ม ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs)

#### 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อบรรเทาอาการของโรคข้อเสื่อม โรคข้อสันหลังอักเสบ
- โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
- ใช้รักษาอาการปวดเฉียบพลัน อาการปวดประจำเดือน
- ใช้รักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1. ยานี้ห้ามใช้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ ส่วนประกอบของยานี้ หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ตัวอื่น หรือยาแอสไพริน
- เคยแพ้ยาในกลุ่มซัลโฟนาไมด์
- มีแผลในกระเพาะอาหาร เลือดออกในทางเดินอาหาร หรือโรคลำไส้อักเสบ
- มีการทำงานของตับหรือไตบกพร่องอย่างรุนแรง
- มีโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หรือเพิ่งได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
- ตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

#### 2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์เมื่อท่านมีอาการต่อไปนี้

- เคยมีเลือดออกหรือมีแผลในทางเดินอาหาร
- อายุมากกว่า 65 ปี
- มีการทำงานของตับหรือไตบกพร่อง
- มีโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ หรือมีภาวะน้ำหนักในร่างกายนาน
- มีภาวะขาดน้ำ เช่น ท้องเสีย หรือใช้ยาขับปัสสาวะ
- กำลังได้รับการรักษาโรคติดเชื้อ
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ขนาดยาโดยทั่วไปคือ 200-400 มิลลิกรัมต่อวัน หรือตามแพทย์สั่ง
- ในกรณีที่ไม่สามารถกลืนแคปซูลยาได้ สามารถแกะยาในแคปซูลโรยลงบนอาหารกึ่งเหลว (เช่น โยเกิร์ต โจ๊ก) ปริมาณ 1 ช้อนชา เพื่อช่วยในการกินยาได้
- ห้ามบดหรือเคี้ยวเม็ดยาเล็กๆ ที่อยู่ในแคปซูล

#### 3.2. ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับการกินยาครั้งถัดไป ให้ข้ามไปกินยาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

#### 3.3. ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมกับยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ของยานี้ หากมีอาการผิดปกติ

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและอาการอันตรายที่อาจจะเกิดจากยา
- หลีกเลี่ยงการ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
- หลีกเลี่ยงการขับชี่ยานพาหนะ หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังจากใช้ยานี้ เนื่องจากยานี้อาจจะทำให้เวียนหัว หรือง่วงนอนได้
- ควรใช้ยาในขนาดต่ำที่สุดที่บรรเทาอาการปวดได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ยกเว้นในกรณีที่แพทย์แนะนำ
- ไม่นายานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th>

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1. อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตมพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำตามผิวหนัง มีไข้ มีอาการคล้ายเป็นหวัด
- เจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอาการของโรคหัวใจ
- ปวดท้องอย่างรุนแรง อาจจะเป็นสีดำหรืออาเจียนเป็นเลือด ซึ่งอาจเป็นอาการของเลือดออกในทางเดินอาหาร
- อาการของตับวาย เช่น คลื่นไส้ ท้องเสีย ดีซ่าน (ตัวเหลือง ตาเหลือง)

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

#### 5.2. อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- มีนงง ปวดหัว นอนไม่หลับ
- ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย
- ขาบวม มีบวม

“เป็นอาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

#### • ลักษณะยา

ความแรง 400 มิลลิกรัม แคปซูลสีขาวขุ่น มีแถบสีเขียวที่ปลอกและตัวแคปซูล มีตัวเลข 7767 และ 400 สีขาวบนแถบ ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงขาวออกสีเหลืองอ่อน ความแรง 200 มิลลิกรัม แคปซูลสีขาวขุ่น มีแถบสีทองที่ปลอกและตัวแคปซูล มีตัวเลข 7767 และ 200 สีขาวบนแถบ ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงขาวออกสีเหลืองอ่อน

• **ตัวยาสำคัญ** คือ ซีลีค็อกซิบ 200 หรือ 400 มิลลิกรัม

• **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ แลคโตสโมโนไฮเดรต (lactose monohydrate) โซเดียมลอริลซัลเฟต (sodium lauryl sulfate) โพลีวิดอน (polyvidone) ครอสคาเมลโลสโซเดียม (croscarmellose sodium) แมกนีเซียมสเตียเรต (magnesium stearate)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 28 สิงหาคม 2567

ผู้ผลิต Viatrix Pharmaceuticals LLC, Puerto Rico

ผู้นำเข้า บริษัท เวียร์ทริค เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ สตรีมีครรภ์ และสตรีระยะให้นมบุตร
2. ห้ามใช้ในผู้ที่ได้รับการผ่าตัด หลอดเลือดหัวใจในระยะเวลาหลังผ่าตัดใหม่ๆ (immediately postoperative period)
3. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมอง
4. หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผื่นแดง หรือมีอาการคล้ายเป็นหวัดให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที
5. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้และผู้ที่มีประวัติแพ้ยาในกลุ่ม sulfonamide
6. เมื่อใช้ยานี้หากมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น ไข้ ผื่นแดง ตุ่มน้ำพอง มีการหลุดลอกของผิวหนังและบริเวณเยื่อต่างๆเช่น ในช่องปาก คอ จมูก อวัยวะสืบพันธุ์ และเยื่อตาอักเสบ ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์ เพราะอาจเป็น Stevens- Johnson syndrome
7. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง (congestive heart failure NYHA II-IV)
8. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน หรือเคยมีภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตอันเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง
9. ระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ผู้สูบบุหรี่ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
10. ระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต