

**นอร์อิพิเนฟริน**  
**ความแรง 1 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร**  
**ชนิดสารละลายสำหรับฉีด**  
**ชื่อการค้า Norvita IV (นอร์วิต้า ไอวี)**

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า นอร์-อี-พี-เนฟ-ริน ไบ-ทา-เทรต (norepinephrine bitartrate) มีตัวยา 1 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มแอดรีเนอร์จิก

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ

- ควบคุมภาวะความดันเลือดต่ำลงอย่างเฉียบพลัน
- ควบคุมภาวะความดันเลือดต่ำอย่างรุนแรง
- รักษาภาวะหัวใจหยุดเต้น

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ผู้ป่วยที่กำลังได้รับยาสลบ

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้แจ้งแพทย์ ในกรณีต่อไปนี้

- กำลังตั้งครรภ์ หรือเป็นผู้ป่วยสูงอายุ
- ภาวะแพ้สารซัลไฟด์
- ผู้ป่วยที่มีลิ้มเลือดในหลอดเลือดส่วนปลายหรือที่อวัยวะภายใน
- โรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคไตหรือยด์เป็นพิษ
- โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด ความดันเลือดสูง
- แจ้งแพทย์ถ้ากำลังใช้ยาเหล่านี้ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาคาลายกั๊งวอล • เอนแท็กคาโพน • ดิจ็อกซิน • ลิเนโซลิด

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่านโดยหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ

### 3.2 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ ปวดศีรษะรุนแรง เหงื่อออก อาเจียน ผิวน้ำเขียวบริเวณที่ฉีด และเจ็บหน้าอก ให้รีบแจ้งแพทย์หรือ พยาบาล

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระมัดระวังการหกล้ม และพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ทำให้เวียนหัวได้

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวน้ำเขียวหลุดลอก มีจ้ำตามผิวน้ำหรือเลือดออกผิดปกติ
- ปลายเท้ามีสีม่วงคล้ำ จากการขาดเลือดไปเลี้ยง
- เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
- รู้สึกว่ากำลังจะเป็นลม ปวดท้อง อาเจียน
- ผิวน้ำเขียวที่ฉีดยามีสีซีด ปวดและระคายเคืองมาก

“หากมีอาการเหล่านี้

ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

### 5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- หลอดเลือดดำอักเสบบริเวณที่ฉีดยา
- ปวดหัว คลื่นไส้ เหงื่อออกมาก วิตกกังวล

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา น้ายาปราศจากเชื้อ สำหรับฉีด ใส่ ไม่มีสี
- **ตัวยาสำคัญ** นอร์อิพิเนฟริน ไบทาเทรต ความแรง 1 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร บรรจุในขวดแก้ว ขวดละ 4 หรือ 8 มิลลิลิตร
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** โซเดียมเมทาไบซัลไฟด์ โซเดียมคลอไรด์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ไฮโดรคลอริก และน้ำ

ผู้ผลิต บริษัทเอบีเอ็ม เมดิคอล จำกัด  
111 หมู่ 9 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร