

คีโทโรแล็ก
ความแรง 30 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ชนิดยาฉีด
ชื่อการค้า Kerolac-30
(คีโรแลค-30)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า คีโทโรแล็ก (Ketorolac) เป็นยากลุ่มแก้ปวดลดอาการอักเสบ

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อระงับอาการปวดหลังผ่าตัด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มต้านอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (เอนเสด)
- มีประวัติเป็นแผลในกระเพาะอาหาร หรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร
- ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคตับหรือโรคไตอย่างรุนแรง
- ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นไข้เลือดออก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ยานี้ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
- ยานี้ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการตีบตันของหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะเมื่อใช้ยาในขนาดสูงเป็นเวลานาน
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - กำลังตั้งครรภ์
 - เป็นผู้สูงอายุ
 - เป็นโรคหัวใจ
 - มีความดันโลหิตสูง

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีการใช้

- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ

3.2 ถ้าได้รับยานี้เกินขนาด ควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น เหนื่อยขา ง่วงซึม คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดท้องให้รีบแจ้ง

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากจำเป็นจะต้องกินยาแก้ปวดตัวอื่นร่วมด้วย

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ปวดท้อง อาเจียนปนเลือด ถ่ายอุจจาระเป็นสีผิดปกติ เช่น ถ่ายเป็นสีดำหรือเลือดสด
- ปัสสาวะไม่ออกหรือออกน้อยลงกว่าปกติ
- ปัสสาวะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ายน้ำโค้ก
- ความอยากอาหารน้อยลง สีตาขาวหรือผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีออกเหลือง
- ปวดหัวรุนแรง มือหรือขาตื้อด้านใดด้านหนึ่งขาหรืออ่อนแรง
- การมองเห็น การพูดหรือการเดินผิดปกติ

“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทันทีหรือกลับมาพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ หรือพยาบาล

- ท้องผูก ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย เจ็บปวดในช่องท้อง แสบร้อนกลางอก คลื่นไส้ มีแผลเปื่อย อาเจียน
- มีงง ง่วงซึม ปวดหัว

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลหรือกลับมาพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ยานี้มีตัวยาสาคัญ คีโทโรแล็ก โทรมะตามีน
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ เอทานอล (ethanol), โซเดียมยวมคลอไรด์ (sodium chloride), โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide), ไฮโดรคลอริกแอซิด (hydrochloric acid), น้ำสำหรับฉีด (water for injection)
- ลักษณะยา น้ำยาปราศจากเชื้อ สำหรับฉีด สี ไม่มีสี ถึงสีเหลืองอ่อน)

ผู้ผลิต บริษัทเอเบิล เมดิคอล จำกัด

111 หมู่ 9 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx)

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**