

## โคลิสติน

ความแรง 150 มิลลิกรัม

ชนิดผงละลายสำหรับฉีดและสุดพ่น  
ชื่อการค้า Kolimycin (โคลิมัยซิน)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โคล-ลิส-ทิน (colistin) มีตัวยา 150 มิลลิกรัม เป็นยาปฏิชีวนะ

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่รุนแรง และไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะตัวอื่นได้ โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

[x] เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่น เช่น โพลีมิกซิน บี

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - โรคไต
  - โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
  - โรคเลือดที่เกิดจากการขาดเอนไซม์บางชนิด
  - เคยมีอาการหลอดลมหดรัดเกร็งจากให้ยาปฏิชีวนะแบบสุดพ่นมาก่อน
- ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมลูก เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- แจ้งแพทย์ถ้ากำลังใช้ยาเหล่านี้ ได้แก่ อะมิคาซิน เจนทาไมซิน โทบราไมซิน เป็นต้น เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

**“หากท่านไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยา หรือมีอาการใดที่มีผลต่อการรักษา โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร”**

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดหรือพ่นยานี้ให้กับท่าน โดยฉีดหรือหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือพ่นยาทางปาก

#### 3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากท่านสงสัยไม่ได้รับยาตามเวลาที่กำหนด ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

#### 3.3 หากสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- เนื่องจากยานี้อาจทำให้เกิดอาการเวียน และ มีปัญหาการมองเห็น ควรหลีกเลี่ยงการขับชี่ยานพาหนะ และทำงานกับเครื่องจักร

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ปัสสาวะมีเลือดปน หรือมีฟองมาก
- อาการชาคล้ายเข็มที่มรอบใบหน้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง ทรงตัวลำบาก
- มองเห็นภาพไม่ชัด พูดไม่ชัด สับสน

**“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

#### 5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ หรือ พยาบาล

- ระคายเคือง หรือมีผื่นแดง บริเวณที่ฉีดยา
- ท้องเสีย มวนท้อง
- ไอ อาจเกิดขึ้นได้เมื่อได้รับยาสุดพ่น

**“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”**

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา ผงยาปราศจากเชื้อ สีขาวถึงขาวออกเหลือง
- ตัวยาสำคัญ โคล-ลิส-ติ-มี-เทต โซ-เดียม 360 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับยา โคล-ลิส-ทิน 150 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ไม่มี

#### ผู้รับอนุญาตและผู้ผลิต

บริษัท เอเมิ้ล เมดิคอล จำกัด  
ที่อยู่ เลขที่ 111 หมู่ 9 ตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 21 กรกฎาคม 2563

#### ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**