

ลิวีโธราซีแอม

ความแรง 500 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด
ชื่อการค้า Levacore (เลวาคอร์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า ลิวีโธราซีแอม (Levetiracetam)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาอาการชักในผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้นานี้

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มอนุพันธ์ของไพโรโรลิโดน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ท่านเป็นโรคไต
 - บุตรของท่านโตช้า หรือมีการพัฒนาทางเพศที่ผิดปกติ
 - เคยได้รับยากันชักแล้วมีอาการซึมเศร้าหรือมีความคิดฆ่าตัวตาย
 - ท่านกำลังใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรอื่นร่วมด้วย
 - ท่านกำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรือกำลังให้นมลูก
 - ท่านจำเป็นต้องกินอาหารที่มีเกลือโซเดียมต่ำ
- ไม่แนะนำให้ใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษาผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 16 ปี

3. วิธีการใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับ ชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะฉีดยาให้โดยการหยดเข้าหลอดเลือดดำ

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากท่านสงสัยไม่ได้รับยาตามเวลาที่กำหนด ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

3.3 หากได้รับยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาดให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ การทำงานกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้ง่วงซึม
- ให้รีบแจ้งแพทย์ หากได้รับยาแล้วยังมีอาการชักอยู่

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และผื่นบนใบหน้าแล้วลุกลามตามลำตัว ร่วมกับมีไข้ และต่อมน้ำเหลืองโต
- บัสสาวะไม่ออก บวมที่ขา-ข้อเท้า น้ำหนักขึ้นเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุ
- อารมณ์แปรปรวน สับสน ง่วงนอนมากผิดปกติ หลงลืม เดินลำบาก มือสั่น

“หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการอื่นที่อาจเกิดขึ้น

- โพรงจมูกและคอหอยอักเสบ ปวดหัว
- เบื่ออาหาร
- ซึมเศร้า นอนไม่หลับ วิตกกังวล ตื่นกลางดึกหงุดหงิดง่าย
- บ้านหมุน มึนงง
- ปวดท้อง ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย อาเจียน
- คลื่นไส้ ไอ
- อาการแพ้
- น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลง
- ตามัว หรือมองเห็นภาพซ้อน
- กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดกล้ามเนื้อ มีความรู้สึกเป็นเหน็บ
- ผมรั้ง อาการคันบนผิวหนัง

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- ในกรณีที่ได้รับยากลับบ้าน ให้ปฏิบัติตามนี้
 - เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
 - เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
 - ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือห้องครัว
 - เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา:** สารละลายใส ไม่มีสี บรรจุในขวดแก้วใส
- **ตัวยาสําคัญ:** ลิวีโธราซีแอม 500 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร
- **ส่วนประกอบอื่นๆ:** กรดแอสซิติคเข้มข้น, โซเดียมมาซิเตท ไตรไฮเดรต, โซเดียมคลอไรด์

ผู้ผลิต บริษัทเอเบิล เมดิคอล จำกัด
111 หมู่ 9 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลยาฉบับย่อ
หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมโปรดปรึกษา
แพทย์หรือเภสัชกรของท่าน**

คำเตือน (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข)

1. ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และไม่ควรดื่มสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมขณะใช้ยานี้
2. ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด
3. ห้ามใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์เพราะอาจทำให้ทารกพิการได้
4. ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต