

ฟอสโฟไมซิน
ความแรง 2 และ 4 กรัม
ชนิดผงสำหรับละลาย
เพื่อหยดเข้าหลอดเลือดดำ
ชื่อการค้า Sanofos IV
(ซาโนฟอส ไอวี)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ฟอสโฟไมซิน (fosfomycin) เป็นยาในกลุ่มต้านเชื้อแบคทีเรีย

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษา
- โรคกระดูกอักเสบติดเชื้อ (เป็นหนอง)
- โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
- โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- โรคสมองอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
- โรคติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องใช้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้**
 - ผู้ป่วยโรคไต
 - มีประวัติท้องร่วงรุนแรงจากการใช้ยาด้านแบคทีเรีย
 - ผู้ป่วยที่ต้องจำกัดปริมาณเกลือโซเดียม เพราะยานี้มีส่วนประกอบของโซเดียม
 - หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
 - กำลังใช้ยา อาหารเสริม สมุนไพรอื่นๆ ร่วมด้วย เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ หากท่านไม่แน่ใจให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน โดยหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- รีบติดต่อโรงพยาบาลและแจ้งแพทย์ทันทีที่นึกได้

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากท่านสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกไม่มีแรง ผิวหนังเป็นรอยช้ำเป็นจ้ำ หรือจุดแดงใต้ผิวหนัง เลือดออกง่ายมากผิดปกติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลหรือแจ้งแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระวังการหกล้ม หรือพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ทำให้มึนงงได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- อ่อนแรง มีไข้ เลือดออกง่าย
- การมองเห็นผิดปกติ
- หัวใจเต้นเร็ว
- ตัวเหลือง ตาเหลือง
- ท้องร่วง ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน มีไข

**“หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

**5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามี
อาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล**

- หลอดเลือดดำอักเสบบริเวณที่ฉีดยา
- ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- โดยทั่วไปยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- หากท่านได้รับยานี้กลับบ้าน ควรปฏิบัติดังนี้
 - เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
 - ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
 - เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ผงยาปราศจากเชื้อ สำหรับฉีด สีขาวถึงสีครีม บรรจุในขวดแก้ว
- **ตัวยาสำคัญ** ฟอสโฟไมซิน
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ กรดซัคซินิก (succinic acid)

ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย บริษัท เอ็มบี เมดิคอล จำกัด
ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**