

ซีสอะทราคูเรียม

ความแรง 2 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร

ความแรง 5 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร

ชนิดสารละลายสำหรับฉีดหรือ

หยดเข้าหลอดเลือด

ชื่อการค้า

Cissabex (Injection 2 mg/mL)

(ซิสซาเบ็กซ์ (ชนิดฉีด 2 มก./มล.))

Cissabex (Injection 5 mg/mL)

(ซิสซาเบ็กซ์ (ชนิดฉีด 5 มก./มล.))

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า ซีสอะทราคูเรียม (Cisatracurium) มีตัวยา 2 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร, 5 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร เป็นยาหย่อนกล้ามเนื้อ

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้หย่อนกล้ามเนื้อในระหว่างการผ่าตัด และใช้ในผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

[X] เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ แอทราคูเรียม หรือยาที่มีโครงสร้างของเบนซีน ซัลโฟนิกแอซิด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และโรคระบบประสาท
 - เคยมีประวัติการชัก
 - เคยแพ้ยาหย่อนกล้ามเนื้อที่ให้ระหว่างผ่าตัด

- แจ้งแพทย์ถ้ากำลังใช้ยาเหล่านี้ ได้แก่ เดตราไซคลีน
- คลินดามัยซิน • โพรพราโนลอล • ฟูโรซีไมด์ เป็นต้น เพราะอาจส่งผลต่อการรักษาหรืออันตรายได้

“หากท่านไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยา หรือมีอาการใดที่มีผลต่อการรักษา โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีการใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ให้ยานี้กับท่านโดยฉีดหรือหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ

3.2 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ มีภาวะกล้ามเนื้อเป็นอัมพาตเป็นเวลานาน ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่มีข้อมูล

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- กล้ามเนื้อเสื่อม และ/หรือกล้ามเนื้ออ่อนล้า
- ชัก

“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- ความดันโลหิตต่ำ
- หัวใจเต้นช้าผิดปกติ

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา น้ำยาปราศจากเชื้อ สำหรับฉีด ใสไม่มีสี ถึงสีเหลืองอ่อน หรือสีเขียวยากเหลือง
- **ตัวยาสําคัญ** ซีสอะทราคูเรียมเบซีเลต
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ เบนซีนซัลโฟนิก แอซิด และน้ำสำหรับยาฉีด

ผู้ผลิต บริษัท เอเบิล เมดิคอล จำกัด
111 หมู่ 9 หนองซอน เชียงยืน
มหาสารคาม 44160

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 29 ตุลาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**