

แอซีเทตริงเกอร์ส ชนิดสารละลายสำหรับฉีด ชื่อการค้า Acetate Ringer's Injection (แอซีเทตริงเกอร์ส สำหรับหยดเข้าหลอดเลือดดำ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสมมีชื่อว่า แอ-ซี-เทต-ริง-เกอร์ส สำหรับหยดเข้าหลอดเลือดดำ (Acetate Ringer's injection) ซึ่งมีตัวยาสำคัญได้แก่
 - โซเดียมคลอไรด์
 - โซเดียมแอซีเทตไตรไฮเดรต
 - โพแทสเซียมคลอไรด์
 - แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ทดแทนปริมาณของสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้นานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

X เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

X มีสารน้ำในร่างกายมากเกินไป

X ห้ามใช้ร่วมกับยาเซฟไตรอะโซนในเด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ภาวะร่างกายมีสารน้ำเกิน
 - เป็นโรคหัวใจ โรคไต
 - กำลังใช้ยาขับปัสสาวะ ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ยาแก้อักเสบ ยารักษาโรคจิต ยาสเตียรอยด์ ยาซีกโคโรสปอริน ทาโครลิมีส

3. วิธีการใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีการใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะฉีดยาให้กับท่านโดยหยดเข้าหลอดเลือดดำ

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากท่านสงสัยว่าไม่ได้รับยาตามเวลาที่กำหนด ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

3.3 หากได้รับยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากท่านสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาดให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- อย่าหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะอาจทำให้อาการแย่ลง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- อาการชัก
- หัวใจเต้นช้าลงหรือเร็วผิดปกติ
- มีอาการหอบ เหนื่อยง่าย
- มีไข้

**“หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- เจ็บ ปวด บวมบริเวณที่ฉีดยา
**“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

- ในกรณีที่ต้องได้รับยากลับบ้าน ให้ปฏิบัติดังนี้
 - เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
 - เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
 - เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา น้ายาปราศจากเชื้อ สำหรับฉีดใส ไม่มีสี บรรจุในขวดพลาสติกมีฝาปิด
- ตัวยาสำคัญ โซเดียมคลอไรด์, โซเดียมแอซีเทตไตรไฮเดรต, โพแทสเซียมคลอไรด์ และ แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ น้ำ

ผู้ผลิต บริษัทเอเบิล เมดิคอล จำกัด
111 หมู่ 9 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 3 ธันวาคม 2563
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
<http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**