

แลคเตตริงเกอร์ส ยูเอสพี ชนิดสารละลายสำหรับฉีด ชื่อการค้า Lactated Ringer's Injection USP (แลคเตตริงเกอร์ส ยูเอสพี สำหรับ หยดเข้าหลอดเลือดดำ)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสมมีชื่อว่า แลค-เทต-ริง-เกอร์ส- ยู-เอส-พี สำหรับหยดเข้าหลอดเลือดดำ (Lactated Ringer's Injection USP) ซึ่งมีด้วยยาสำคัญได้แก่
 - โซเดียมคลอไรด์
 - โซเดียมแลคเตต
 - โพแทสเซียมคลอไรด์
 - แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ทดแทนปริมาณของสารน้ำหรืออิเล็กโทรไลต์ ทำหน้าที่เหมือนสารเพิ่มความเข้มข้นในผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้น้ำยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้น้ำยา

2.1 ห้ามใช้น้ำยานี้เมื่อไร

- X** เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- X** ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้โซเดียม แลคเตต
- X** ห้ามใช้ร่วมกับยาเซฟไตรอะซอนในเด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้น้ำยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ภาวะร่างกายมีสารน้ำเกิน
 - ภาวะบวม มีโซเดียมคั่ง
 - เป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคตับ โรคเบาหวาน

- กำลังใช้ยาขับปัสสาวะ ยาขับชัก ยารักษาโรคจิต ยากลุ่มสเตอรอยด์ ยาซีกโคลสปอริน ทาโครลิมีส ลิเทียม ดิจ็อกซิน

3. วิธีการใช้น้ำยา

3.1 ขนาดและวิธีการใช้

- ควรใช้น้ำยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้น้ำยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะฉีดยาให้กับท่านโดยการหยดเข้าหลอดเลือดดำ

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากท่านสงสัยว่าไม่ได้รับยาตามเวลาที่กำหนด ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

3.3 หากได้รับยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากท่านสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาดให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้น้ำยา

- อย่าหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะอาจทำให้อาการแย่ลง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- หัวใจเต้นช้าลงหรือเร็วผิดปกติ
- ความดันต่ำ
- หลอดลมตีบ

**“หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- คลื่นไส้ อาเจียน
 - มีไข้ ปวดหัว
 - เจ็บ ปวด บวม บริเวณที่ฉีดยา
- “ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”**

6. ควรเก็บยาน้ำอย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- ในกรณีที่ต้องได้รับยากลับบ้าน ให้ปฏิบัติตามนี้
 - เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
 - เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
 - เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยาน้ำ

- ลักษณะยา น้ำยาปราศจากเชื้อ สำหรับฉีดใส ไม่มีสี บรรจุในขวดพลาสติกมีฝาปิด
- ตัวยาสสำคัญ โซเดียมคลอไรด์, โซเดียมแลคเตต, โพแทสเซียมคลอไรด์ และ แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ น้ำ

ผู้ผลิต บริษัทเอมัล เมดิคอล จำกัด
111 หมู่ 9 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 3 ธันวาคม 2563
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
<http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**