

ทราสทูซูแมบ เดิร์กซ์ทีแคน
100 มิลลิกรัม
ชนิดผงสำหรับละลาย
เพื่อให้ยาทางหลอดเลือดดำ
ชื่อการค้า ENHERTU® (เอนเฮอ์ทู่®)

1. ยานี้คือยาอะไรและใช้เพื่ออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ทราส-ทู-ซู-แมบ-เด-ิร์กซ์-ที-แคน (trastuzumab deruxtecan)
- เป็นยาในกลุ่ม ยาต้านมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปอด หรือมะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วว่าต้องใช้นานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้

- อาการไอ หายใจลำบาก ไข้ หรืออาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาการหายใจที่เพ่งเป็นหรือแฉ่ง
- เคยป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับปอดมีโรคไต
- มีโรคหัวใจ
- มีโรคตับ
- อายุต่ำกว่า 18 ปี
- กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้นานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำเท่านั้น
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ ให้กับท่าน

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- ติดต่อแพทย์ทันทีเพื่อนัดหมายการฉีดยาครั้งใหม่

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้สังเกตภาวะผิดปกติอย่างใกล้ชิด หากมีอาการที่รุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากการใช้ยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้รับยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ยานี้อาจทำให้ความสามารถในการมีบุตรลดลง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มการรักษา
- เพศชาย ให้คุมกำเนิดระหว่างที่ได้รับยานี้ และคุมกำเนิดต่อเนื่องหลังจากหยุดยา อย่างน้อย 4 เดือน
- เพศหญิง ให้คุมกำเนิดระหว่างที่ได้รับยานี้ และคุมกำเนิดต่อเนื่องหลังจากหยุดยา อย่างน้อย 7 เดือน

- งดให้นมลูกระหว่างที่ได้รับยานี้ และงดต่อเนื่องหลังจากหยุดยาอย่างน้อย 7 เดือน
- ระมัดระวังการขับรถ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังจากได้รับยานี้ เพราะยานี้อาจจะทำให้อ่อนเพลีย เวียนหัว หรือปวดหัว

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- ไอ มีไข้ หายใจไม่อึด
- มีแผลในปาก ปวดท้อง หรือปวดขณะปัสสาวะ
- ชาบวม ข้อเท้าบวม น้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว หัวใจเต้นผิดปกติ มึนงง หมดสติ
- มีไข้ หนาวสั่น ตัวแดง ผื่นคัน ขณะฉีดยา

“ให้แจ้งแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียหรือท้องผูก เบื่ออาหาร อาหารไม่ย่อย การรับรสเปลี่ยนแปลงไป ท้องอืด
- ผมร่วง อ่อนเพลีย น้ำหนักลด
- ปวดกล้ามเนื้อหรือกระดูก
- ปวดหัว เวียนหัว เลือดกำเดาไหล
- ผื่น คัน ผื่นหนังเปลี่ยนสี
- ตาแห้ง มองเห็นภาพไม่ชัด
- ปากแห้ง กระหายน้ำ

“ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”
“แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณมีอาการใดๆ รวมถึงอาการที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้จะถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับยานี้กลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ผงสีขาวถึงขาวเหลือง บรรจุในขวดแก้ว
- **ตัวยาสำคัญ** คือ ทราสทูซูแมบ เดริกซ์ ที แคน ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ แอล-ฮิสทีดีน แอล-ฮิสทีดีน ไฮโดรคลอไรด์ โมโนไฮเดรต ซูโครส โพลีซอร์เบต 80

ผู้ผลิต

บริษัท แม็กซ์เตอร์ อองโคโลยี จำกัด

ประเทศเยอรมัน

ผู้นำเข้า

บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร