

กรดเบมฟีโดอิก
180 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Nexletol® (เน็กซ์เลทอล®)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่ากรด-เบม-พี-โด-อิก (bempedoic acid)
 - เป็นยาในกลุ่ม ยาลดไขมันในเลือด
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ใช้รักษาภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงที่ไม่ทราบสาเหตุ หรือไขมันในเลือดสูงแบบผสม ซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วว่าต้องใช้นี้
 - ใช้รักษาภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงในผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วว่าต้องใช้นี้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้ เมื่อไร**
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
 - กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
 - กำลังใช้ยาลดไขมันชื่อว่า ซิมวาสแตติน ในขนาดมากกว่า 40 มิลลิกรัมต่อวัน
 - อายุต่ำกว่า 18 ปี
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้**
- เป็นโรคเกาต์
 - มีโรคตับหรือโรคไตอย่างรุนแรง
 - เคยได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าท่านแพ้แลคโตส
 - ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่ โดยเฉพาะยาลดระดับไขมันในเลือด ยารักษาความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจล้มเหลว ยารักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้นเพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - กินยาครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
 - กลืนยาทั้งเม็ดพร้อมอาหาร หรือขณะท้องว่างก็ได้
- 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**
- ถ้านึกได้ภายในวันที่ลืม ให้กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้
 - ถ้านึกได้ในอีกวัน ให้ข้ามยาเม็ดที่ลืมไปกินยาตามเวลาปกติในมือถัดไป
 - ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่าเพื่อชดเชยยาที่ลืม
- 3.3 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากการใช้ยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้น หรือส่วนอื่นของร่างกาย
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผื่นหนัง
- “ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”**
- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์ทันที**
- ปวดไหล่ แขน ขา เกาต์
 - น้ำหนักตัวลดลง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น ให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- ห้ามใช้ยาหลังจากวันหมดอายุ (EXP) ที่ระบุบนแผงยาและกล่องยาวันที่หมดอายุจะกำหนดเป็นวันสุดท้ายของเดือน
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** เป็นยาเม็ดรีเคลือบฟิล์ม สีขาวถึงขาวนวล ด้านหนึ่งพิมพ์ตัวอักษร “180” อีกด้านพิมพ์ตัวอักษร “ESP”
- ตัวยาสําคัญ** คือ กรดเบมฟีโดอิก
- ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ แลคโตสโมโนไฮเดรต, ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส, โซเดียมสเตียเรตซัลเฟต (ชนิดเกรด A), ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส, แมกนีเซียมสเตียเรต, ซิลิกา คอลลอยด์แอลไฮดรัส, พาร์เชิลล์ไฮโดรไลส์ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, ทาลค์, โทเทเนียมไดออกไซด์, มาโครกอล/โพลีเอทิลีนไกลัยคอล

ผู้ผลิต: บริษัท พีรามอล เฮลท์แคร์ ยูเค จำกัด, สหราชอาณาจักร

ผู้บรรจุและตรวจปล่อยผ่าน:
บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว ยุโรป จำกัด, ประเทศเยอรมนี

ผู้นำเข้า: บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ เดือนกรกฎาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>