

ทรามูซุมแมบ เดิร์กซ์ทีแคน
100 มิลลิกรัม
 ชนิดผงสำหรับละลายเพื่อให้ยาทางหลอดเลือดดำ
ชื่อการค้า ENHERTU® (เอนเฮอ์ทู®)

1. ยานี้คืออะไรและใช้เพื่ออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า ทรามู-ซู-ซู-แมบ-เด-ิร์กซ์-ที-แคน (trastuzumab deruxtecan)
 - เป็นยาในกลุ่ม ยาต้านมะเร็ง
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- รักษาโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปอด หรือมะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วว่าต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**
เมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้
- อาการไอ หายใจลำบาก ไข้ หรืออาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจที่เพิ่งเป็นหรือแยลง
 - เคยป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับปอดมีโรคใด
 - มีโรคหัวใจ
 - มีโรคตับ
 - อายุต่ำกว่า 18 ปี
 - กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้องหรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
 - ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิด และความรุนแรงของโรค
 - ยานี้ใช้สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำเท่านั้น
 - แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ ให้กับท่าน
- 3.2 หากลืมไปฉีดยาตามนัดควรทำอย่างไร**
- ติดต่อแพทย์ทันทีเพื่อนัดหมายการฉีดยาครั้งใหม่
- 3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
 ให้สังเกตภาวะผิดปกติอย่างใกล้ชิด หากมีอาการที่รุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากการใช้ยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้รับยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ยานี้อาจทำให้ความสามารถในการมีบุตรลดลง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มการรักษา
- เพศชาย** ให้คุมกำเนิดระหว่างที่ได้รับยานี้ และคุมกำเนิดต่อเนื่องหลังจากหยุดยา อย่างน้อย 4 เดือน
- เพศหญิง** ให้คุมกำเนิดระหว่างที่ได้รับยานี้ และคุมกำเนิดต่อเนื่องหลังจากหยุดยา อย่างน้อย 7 เดือน
- งดให้นมลูกระหว่างที่ได้รับยานี้ และงดต่อเนื่องหลังจากหยุดยาอย่างน้อย 7 เดือน
- ระมัดระวังการขับรถ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หลังจากได้รับยานี้ เพราะยานี้อาจจะทำให้ อ่อนเพลีย เวียนหัว หรือปวดหัว

คำเตือน: ยานี้ อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <https://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 2567

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
 - ไอ มีไข้ หายใจไม่อึด
 - มีแผลในปาก ปวดท้อง หรือปวดขณะปัสสาวะ
 - ขาบวม ข้อเท้าบวม น้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว หัวใจเต้นผิดปกติ มึนงง หมดสติ
 - มีไข้ หนาวสั่น ตัวแดง ผื่นคัน ขณะที่ฉีดยา
- “ให้แจ้งแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียหรือท้องผูก เบื่ออาหาร อาหารไม่ย่อย การรับรสเปลี่ยนแปลงไป ท้องอืด
 - ผมร่วง อ่อนเพลีย น้ำหนักลด
 - ปวดกล้ามเนื้อหรือกระดูก
 - ปวดหัว เวียนหัว เลือดกำเดาไหล
 - ผื่น คัน ผิวหนังเปลี่ยนสี
 - ตาแห้ง มองเห็นภาพไม่ชัด
 - ปากแห้ง กระจายน้ำ
- “ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**
“แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณมีอาการใดๆ รวมถึงอาการที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้จะถูกเก็บที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับยานี้กลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา** ผงสีขาวถึงขาวเหลือง บรรจุในขวดแก้ว
- ตัวยาสาคัญ** คือ ทรามูซุมแมบเดิร์กซ์ทีแคน
- ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ แอล-ฮิสทีดิน แอล-ฮิสทีดินไฮโดรคลอไรด์ โมโนไฮเดรต ซูโครส โพลีซอร์เบต 80

ผู้ผลิต: บริษัท แบริกซ์เตอร์ อองโคโลยี จำกัด ประเทศเยอรมัน

ผู้นำเข้า: บริษัท ไตอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด



TH 123327

