

**กรดเบมปีโดอิก 180 มิลลิกรัม
และอีเซทิไมบ์ 10 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Nexlizet® (เน็กซ์ลิเซท®)**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ เป็นยาสูตรผสมมีตัวยาคือ กรด-เบม-พี-โด-อิก(bempidoic acid) ความแรง 180 มิลลิกรัม และ อี-เซ-ทิ-ไมบ์ (ezetimibe) ความแรง 10 มิลลิกรัม
- เป็นยาในกลุ่มลดไขมันในเลือด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงที่ไม่ทราบสาเหตุ หรือไขมันในเลือดสูงแบบผสม ซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วว่าต้องใช้ยานี้
- ใช้รักษาภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงในผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วว่าต้องใช้ยานี้

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้ เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้องหรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- กำลังใช้ยาลดไขมันที่ชื่อว่า ซิมวาสแตติน ในขนาดมากกว่า 40 มิลลิกรัมต่อวัน
- มีโรคตับและกำลังใช้ยาซิมวาสแตติน
- อายุต่ำกว่า 18 ปี

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้

- เป็นโรคเกาต์
- มีโรคไตอย่างรุนแรง
- มีโรคตับปานกลางหรือรุนแรง
- เคยได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าท่านแพ้แลคโตส
- ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่ โดยเฉพาะยาลดระดับไขมันในเลือด ยารักษาความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจล้มเหลว ยารักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อเดือน กรกฎาคม 2567
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.
<http://ndi.fda.moph.go.th/>

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
- กลืนยาทั้งเม็ดพร้อมอาหาร หรือขณะท้องว่างก็ได้
- ถ้ากินยาลดไขมันที่มีชื่อว่า คอเลสโทรามิน ร่วมด้วย ให้กินยานี้ 2 ชั่วโมงก่อนหน้า หรือ 4 ชั่วโมงหลังจากกินยากอเลสโทรามิน

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้านึกได้ภายในวันที่ลืม ให้กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้
- ถ้านึกได้ในอีกวัน ให้ข้ามยาเม็ดที่ลืม ไปกินยาตามเวลาปกติในมือถัดไป
- ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่าเพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ระมัดระวังการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังจากกินยานี้ เพราะยานี้อาจทำให้เวียนหัวได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มี้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
 - ปวดกล้ามเนื้อ หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 - ตัวเหลือง ตาเหลือง ปวดท้อง ปัสสาวะสีเข้ม ข้อเท้าบวม เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย
 - ปวดท้องร่วมกับมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
- “ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดหัว เวียนหัว
- ความดันโลหิตสูง ไอ
- ปวดท้อง ท้องผูกหรือท้องเสีย ท้องอืด ปากแห้ง คลื่นไส้
- เกาต์
- ร้อนวูบวาบ คัน
- มีอบวม ขาบวม
- ปวดคอ เจ็บหน้าอก น้ำหนักตัวลดลง

**ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนและชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามใช้ยาหลังจากวันหมดอายุ (EXP) ที่ระบุบนแผงยาและกล่องยา วันที่หมดอายุจะกำหนดเป็นวันสุดท้ายของเดือน
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** เป็นเม็ดรีเคลือบฟิล์ม สีฟ้า ด้านหนึ่งพิมพ์ตัวอักษร “818” อีกด้านพิมพ์ตัวอักษร “ESP”
- ตัวยาสําคัญ** กรดเบมปีโดอิก และอีเซทิไมบ์
- ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ แลคโตส โมโนไฮเดรต, โมโคคริสตัลลีน เซลลูโลส, โซเดียม สตาร์ทซ์ โกลโคเลท (ชนิดเกรด A), ไฮดรอกซีโพรพิล เซลลูโลส, แมกนีเซียม สเตียเรท, ซิลิกา, คอลลอยด์ล แอนไฮดรัส, โซเดียมลอริลซัลเฟต, โพรโตน (เค30), พาร์เชียลล์ไฮโดรไลส์ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, ทัลค์, โทเทเนียม ไดออกไซด์, อินดิโกคาร์มิน อะลูมิเนียมเลด, กลีเซอรอล โมโนคาพริโลคาเพรต, บริลเลียนท์บลู เอพีซีเอฟ อะลูมิเนียมเลด

ผู้ผลิต: บริษัท พีรามอล ฟาร์มา จำกัด ประเทศอินเดีย
ผู้บรรจุและตรวจปล่อยผ่าน:
บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว ยุโรป จำกัด ประเทศเยอรมนี
ผู้นำเข้า: บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย