

โคลพิโดเกรล
75 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Plavix (พลาวิค)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า โคลพิโดเกรล ไฮโดรเจน ซัลเฟต (Clopidogrel hydrogen sulphate)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อป้องกันการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดไม่ให้จับตัวกันเป็นลิ่มเลือด และ ลดการอุดตันของหลอดเลือด ในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ ส่วนประกอบของยานี้
- โรคตับ หรือ ตับทำงานผิดปกติรุนแรง
- มีภาวะเลือดออกผิดปกติ เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหาร เลือดออกในสมอง
- หญิงที่กำลังให้นมทารก

2.2 เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่ โดยเฉพาะยาที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกผิดปกติ เช่น แอสไพริน วาร์ฟาริน เฮพาริน เป็นต้น
- ตับ หรือ ไต ทำงานผิดปกติ
- เคยมีเลือดออกหรือมีแผลที่กระเพาะอาหาร
- เพิ่งเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัด

- เพิ่งมีภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน
- หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ และหญิงที่กำลังให้นมทารก

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยาได้อย่างไร

- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หรือตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือภาชนะบรรจุทันทีหากมีอาการผิดปกติ เช่น เกิดจ้ำเลือด มีแผลแล้วเลือดไหลไม่หยุด ถ่ายดำ หรือ อาเจียนเป็นเลือด

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน
- ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร ห้ามหยุดยาเอง
- ไม่ควรหยุดรับประทานยาเอง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนหยุดรับประทานยา
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา และผลข้างเคียงจากยา
- แจ้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ทุกครั้งว่ากำลังใช้ยานี้อยู่ ก่อนรับการรักษาหรือรับยาชนิดอื่น
- ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดบาดแผล เพราะยานี้อาจทำให้เลือดไหลผิดปกติ และหยุดยาก

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ดีซ่าน ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติที่ตับ
- ปวดท้องรุนแรง มีเลือดออกในทางเดินอาหาร ปวดท้องรุนแรง อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระสีดำ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่สบายท้อง อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง ท้องอืด แน่นท้อง ท้องผูก แสบร้อนกลางอก
- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
- ปวดศีรษะ วิงเวียน ชา เวียนศีรษะบ้านหมุน
- มีผื่นขึ้น อาการคันที่ผิวหนัง

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว พับมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- สามารถดูข้อมูลลักษณะและส่วนประกอบของยาเพิ่มเติมได้ในเอกสารกำกับยาฉบับเต็ม
- เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 พฤษภาคม 2567