

**วัคซีนไขหวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย
4 สายพันธุ์
ชนิดน้ำแขวนตะกอน
ขนาด 0.5 มิลลิลิตรต่อไขรินจ์
VaxigripTetra (วาซิกิริปเตตรา)**

1. วัคซีนนี้คือวัคซีนอะไร

1.1 วัคซีนนี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- วัคซีนนี้มีชื่อสามัญว่า วัคซีนไขหวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย 4 สายพันธุ์ (quadrivalent influenza vaccine, split virion, inactivated)

1.2 วัคซีนนี้ใช้เพื่ออะไร

- วัคซีนนี้ใช้เพื่อ ป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ใน ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป
- วัคซีนนี้มีผลป้องกันโรคไขหวัดใหญ่หลังจากได้รับวัคซีนไปแล้ว 2-3 สัปดาห์ และไม่มีผลในการป้องกันไขหวัดธรรมดา
- เมื่อให้วัคซีนนี้ขณะตั้งครรภ์จะช่วงป้องกันท่านและลูกในครรภ์นับจากวันคลอดจนถึงอายุ 6 เดือน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้วัคซีน

2.1 ห้ามใช้วัคซีนนี้เมื่อไร

- เคยแพ้วัคซีนนี้ไข เนื้อไก่ นีโอไมซิน ฟอर्मาลดีไฮด์ หรือออกโตซินอล-9 ซึ่งเป็น ส่วนประกอบของวัคซีนนี้
- มีไข้สูงหรือกำลังมีอาการป่วย ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนนี้ออกไปจนกว่าจะหายเป็นปกติ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้วัคซีนนี้

- แจ้งแพทย์หากท่านหรือลูกของท่านมีภาวะต่อไปนี้
 - เกล็ดเลือดต่ำ หรือ เป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติในการหยุดเลือด เนื่องจากการฉีดวัคซีนอาจทำให้เลือดออกได้
 - ภูมิคุ้มกันต่ำหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน เพราะอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง

- เคยวูบหรือเป็นลม ก่อนหรือหลังการฉีดวัคซีน เนื่องจากกลัวการฉีดยา
- หากท่านตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนได้รับวัคซีนนี้
- วัคซีนนี้ใช้ได้ทุกระยะของการตั้งครรภ์
- วัคซีนนี้อาจไม่ได้ให้ผลป้องกันได้อย่างเต็มที่กับทุกคนที่ได้รับวัคซีน
- ทารกอายุน้อยกว่า 6 เดือนที่เกิดจากมารดาที่ได้รับวัคซีนขณะตั้งครรภ์อาจไม่ได้รับการป้องกันทุกคน

3. วิธีใช้วัคซีน

3.1 ขนาดและวิธีใช้

แนะนำฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร:

- เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 9 ปี:
 - เคยได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่มาก่อน ให้ฉีด 1 เข็ม ต่อปี
 - ไม่เคยได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่มาก่อน ให้ฉีดเข็มแรก 1 เข็ม และฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน
- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป: ฉีด 1 เข็ม ต่อปี
- สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่ 1 เข็มขณะตั้งครรภ์อาจป้องกันลูกของท่านตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 6 เดือน

3.2 หากลืมมารับวัคซีนควรทำอย่างไร

- ให้มาพบแพทย์เพื่อวางแผนในการฉีดวัคซีนใหม่

4. ข้อควรปฏิบัติหลังจากฉีดวัคซีน

- อยู่สังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 30 นาที หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที
- แจ้งแพทย์หากท่านหรือลูกของท่าน ต้องตรวจเลือดหลังจากฉีดวัคซีน เพราะวัคซีนอาจทำให้ผลการตรวจเลือดบางชนิดคลาดเคลื่อนได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากวัคซีน

5.1 อาการที่ต้องไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้นบวม
- หน้ามืด เป็นลม แขนขาอ่อนแรง หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

"รีบแจ้งหรือไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์

- ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ
- มีไข้ รู้สึกไม่สบาย
- มีอาการปวด บวม แดง และผิวหนังแข็งกระด้างบริเวณที่ฉีด

"ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที"

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บวัคซีนนี้อย่างไร

- วัคซีนนี้จะเก็บที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเท่านั้น ท่านจะไม่ได้รับวัคซีนนี้กลับบ้าน
- เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 2-8 องศาเซลเซียส และเก็บไว้ในกล่องบรรจุเดิมเพื่อป้องกันแสง
- ห้ามแช่แข็ง

ผู้ผลิต: Sanofi Winthrop Industrie, Val de Reuil, French republic.

ผู้นำเข้า: บริษัท ชานอฟี ปาสเตอร์ จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 09 กรกฎาคม 2568

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**