

คาร์โบซิสเทอีน
ความแรง 450 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร
ชนิด น้ำเชื่อม
ชื่อการค้า BRONGO (บรองโก)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า คาร์-โบ-ซิส-เท-อีน-ไล-ซีน (carbocysteine lysine) เป็นยาละลายเสมหะ

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อละลายเสมหะ ในโรคที่ทางเดินหายใจมีความผิดปกติทั้งชนิดเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ซึ่งส่งผลต่อการมีเสมหะที่เหนียวข้น หรือมากผิดปกติ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังเป็นแผลในกระเพาะอาหาร หรือแผลในลำไส้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- เป็นโรคหอบหืดและเคยมีภาวะหลอดลมหดรัดเกร็ง มีภาวะการหายใจล้มเหลวรุนแรง หรือมีภาวะอ่อนแรง
- เคยเป็นแผลในกระเพาะอาหาร หรือแผลในลำไส้
- หญิงตั้งครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรกและหญิงให้นมลูก
- กำลังใช้ยาแก้อาการไอชนิดอื่น
- เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี

หากไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือใช้ยาดังกล่าว ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ผู้ใหญ่
 - กินครั้งละ 30 มิลลิลิตร วันละ 1 ครั้ง หรือครั้งละ 15 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง
- เด็ก
 - ไม่ควรใช้ในทารกและเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี
 - อายุ 1-5 ปี กินครั้งละ 2.5 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง
 - อายุมากกว่า 5 ปี กินครั้งละ 5 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยานี้ ควรกินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลากับครั้งถัดไป ให้รอกินครั้งถัดไปตามปกติ ด้วยปริมาณยาเท่าเดิม ห้ามกินยาเพิ่ม 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- แจ้งแพทย์ หรือเภสัชกร หากใช้ยานี้ประมาณ 1 สัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแสบ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องเสีย

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** ยาน้ำใส สีน้ำตาลออกเหลือง กลิ่นเชอร์รี่
- ตัวยาสำคัญ** คาร์โบซิสเทอีนไลซีน (carbocysteine lysine)
- ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ ไดเบสิกโซเดียมฟอสเฟตเตตราไฮเดรต, โมโนเบสิกโซเดียมฟอสเฟตไดไฮเดรต, โพรพิลพาราเบนโซอิค, ซูคราโลส, แอมโมเนียมกลีซีไรเสต, ไพรดีออกซินไฮโดรคลอไรด์, สารละลายมอลทิทอล, สารละลายซอร์บิทอล, คาราเมล, กลิ่นเนเชอรัลเชอร์รี่, น้ำบริสุทธิ์

ผู้ผลิต บริษัท ไบโอแอลป์ จำกัด,
625 นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ ตุลาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**