

เอนาลาพริล

ความแรง 5 และ 20 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ด

ชื่อการค้า ENARIL TABLETS (5 mg.)

(ยาเม็ด อีนาริล (5 มก.)) และ

ENARIL TABLETS (20 mg.)

(ยาเม็ด อีนาริล (20 มก.))

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า เอนาลาพริลมาลีเอต (enalapril maleate) เป็นยาในกลุ่มยาลดความดันโลหิตสูง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ควบคุมความดันเลือด
- รักษาโรคหัวใจล้มเหลว

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่ม ACE inhibitors
- หญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 และ 3 (ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)
- ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องขั้นรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- หากมีภาวะต่อไปนี้ ได้แก่ โรคไต หรือโรคไตที่ต้องฟอกเลือด โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคตับ และโรคหลอดเลือดสมองควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
- หากมีอาการอาเจียน ท้องเสียรุนแรง หรืออยู่ระหว่างการควบคุมเกลือในอาหารอย่างเคร่งครัด ควรใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงได้
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาขับปัสสาวะบางชนิด ยาต้านอ็อกเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ ลิเทียม ยาตกภูมิคุ้มกัน ยาฉีดอินซูลิน ยาอัลโลพูรินอล ยาลดกรด เป็นต้น

- หญิงให้นมบุตร หรือวางแผนจะให้มนบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ขนาดยาในเด็กตามน้ำหนักตัว หรือตามแพทย์สั่ง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าลืมกินเกิน 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อต่อไปและห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ห้ามหยุดยาเองและให้กินยานี้อย่างต่อเนื่อง ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ไอแห้ง
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง

- โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

• ลักษณะยา

ยาเม็ด อีนาริล (5 มก.): ยาเม็ดรูปหัวใจ นูน สีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร BIOLAB อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง

ยาเม็ด อีนาริล (20 มก.): ยาเม็ดรูปหัวใจ นูน เล็กน้อย สีส้มอ่อน ด้านหนึ่งมีอักษร BIOLAB อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง

• ตัวยาสำคัญ เอนาลาพริลมาลีเอต

• ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่

ยาเม็ด อีนาริล (5 มก.): microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส), corn starch (คอร์นสตาร์ช), lactose monohydrate (แลคโตสโมโนไฮเดรต), magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรท), povidone K-30 (โพรโอดิน เค-30), sodium bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) และ purified water (น้ำบริสุทธิ์)

ยาเม็ด อีนาริล (20 มก.): microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส), corn starch (คอร์นสตาร์ช), sunset yellow lake (ซันเซตเยลโลว์ สีเหลืองส้ม), lactose monohydrate (แลคโตสโมโนไฮเดรต), magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรท), povidone K-30 (โพรโอดิน เค-30), sodium bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) และ purified water (น้ำบริสุทธิ์)

ผู้ผลิต บริษัท ไบโอแอลป์ จำกัด,

625 นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด,

55 อาคารไบโอเฮาส์ สุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ

โทร.0-2258-9999

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ เมษายน 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx)

▪ <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

▪ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร