

คีโทโคนาโซล
ความแรง 200 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า FUNGAZOL TABLETS
(ยาเม็ด ฟิงกาซอล)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า คีโทโคนาโซล (ketoconazole) มีตัวยา 200 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มต้านเชื้อรา

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อรา

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มเอโซลหรืออิมิดาโซล
- ห้ามใช้ในผู้มีปัญหาโรคตับ เพราะยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- ผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำ
- เป็นโรคหัวใจที่อัตราการเต้นไม่สม่ำเสมอ
- เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี
- หากท่านใช้ยาอื่นอยู่ เนื่องจากมียาหลายชนิดที่ห้ามใช้ร่วมกับยานี้
- หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังการใช้ยานี้
- หญิงให้นมบุตร เพราะยาถูกขับออกทางน้ำนม และอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ในทารกที่ดื่มนมได้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกลืนยาทั้งเม็ดพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที และดื่มน้ำตาม เพื่อช่วยให้ยาดูดซึมได้ดีขึ้น และลดอาการปวดมวนท้องจากยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าลืมเกิน 2 ชั่วโมงให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น เวียนหัว ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วงรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- ไม่ควรดื่มเหล้าระหว่างกินยานี้ และหลังจากหยุดกินยาแล้วอย่างน้อย 2 วัน เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับ
- ถ้าต้องผ่าตัดใหญ่ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่าคุณกำลังกินยาคีโทโคนาโซลอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลให้แพทย์สำหรับติดตามผลการรักษาบางประการจากการผ่าตัด
- หากต้องกินยาลดกรด ควรกินห่างจากยานี้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพราะจะทำให้คีโทโคนาโซลถูกดูดซึมได้น้อยลง
- อาจทำให้ดวงตาของท่านไวต่อแสง อาจสวมแว่นตาตาเมื่อต้องอยู่ในที่มีแสงแดดหรือแสงไฟจ้า
- ยานี้อาจทำให้เวียนหัวหรือง่วงนอนแต่พบได้น้อยมาก ควรระมัดระวังการใช้ในกรณีที่ต้องทำงานซึ่งต้องใช้สมาธิ เช่น การขับรถ หรือทำงานกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง และถ้าท่านกินยาอื่นที่ทำให้ง่วงนอนด้วย

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ
- ปัสสาวะสีคล้ำขึ้นหรือเป็นสีน้ำตาล อุจจาระมีสีซีด เบื่ออาหาร ผื่นหนังหรือตาเหลือง
- อ่อนเพลียผิดปกติ มึนงง การมองเห็นผิดปกติ ตาไวต่อแสงมาก

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปวดหัว เวียนหัว
- สมรรถภาพทางเพศลดลง
- คัดเต้านม

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา เม็ดกลม แบน สีขาว ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งมีอักษร BIOLAB
- ตัวยาสำคัญ คีโทโคนาโซล (Ketoconazole)
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ โปวีโดเนเค-30 (povidone K-30) ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) คอร์นสตาร์ช (corn starch) แลคโตส (lactose) โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต (sodium starch glycolate) แมกนีเซียมสเตียเรท (magnesium stearate)

ผู้ผลิต บริษัท ไบโอดีแลป จำกัด,
625 นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด,
55 อาคารไบโอเฮ้าส์ สุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ
โทร.0-2258-9999
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พฤษภาคม 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>