

# ฟลูนาไรซีน 5 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล ชื่อการค้า FLUDAN CAPSULES (ฟลูดานแคปซูล)

## 1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า ฟลูนาไรซีน ไฮโดรคลอไรด์ (flunarizine hydrochloride)
- ใช้ป้องกันอาการปวดศีรษะข้างเดียว (ไมเกรน)
- ควรเลือกใช้นี้เป็นยาอันดับรอง และภายใต้คำแนะนำของแพทย์ และเภสัชกร

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- แพ้ยานี้ หรือแพ้ยามีโครงสร้างคล้ายกัน เช่น ซินนาริซีน (cinnarizine)
- เคยเป็นหรือกำลังเป็นโรคซึมเศร้า
- เป็นผู้ที่มีอาการของโรคพาร์กินสัน

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ยานี้อาจทำให้โรคอื่นรุนแรงขึ้นหากท่านมีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้
  - เป็นโรคตับ
- ผู้ป่วยบางกลุ่มอาจได้รับอันตรายจากยานี้มากขึ้น ได้แก่
  - อายุมากกว่า 60 ปี
  - เพศหญิงที่มีประวัติเป็นโรคซึมเศร้า
- ยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของการใช้ยานี้ในผู้ป่วยบางกลุ่ม ได้แก่
  - เด็ก
  - หญิงมีครรภ์
  - สตรีให้นมบุตร
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับ ยานอนหลับหรือยากล่อมประสาท และไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการรักษา
- ควรระมัดระวังเมื่อควบคุมเครื่องจักรหรือขับขี่ยานยนต์ เพราะยานี้อาจทำให้ง่วงได้

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับอายุของผู้ป่วยและการตอบสนองต่อการรักษา
- ไม่ใช้ยานี้เกินกว่าขนาดยาที่แพทย์สั่ง
- ในแต่ละสัปดาห์ควรกินยาต่อเนื่องกันเพียง 5 วัน และหยุดยา 2 วัน (เช่นหยุดกินยาในวันเสาร์และอาทิตย์) เพื่อลดอันตรายจากการใช้ยานี้อย่างต่อเนื่อง
- ไม่ควรกินยานี้อย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะอาจเกิดอันตรายจากยาได้

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้านึกได้ใกล้กับเวลามื้อถัดไป ให้เว้นยาในมื้อนั้น แล้วรอกินยาของมื้อต่อไป โดยห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ง่วงซึมมาก สันผิปกติ หัวใจเต้นเร็ว ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- รับประทานยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทพร้อมด้วย เมื่อแพทย์สั่งเท่านั้น

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีอาการของภาวะซึมเศร้า เริ่มนอนหลับยาก วิตกกังวล
- เคลื่อนไหวช้าลงมาก กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวอย่างควบคุมไม่ได้หรือกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ง่วงนอน เหนื่อยชาผิดปกติ
- คัดจมูกหรือมีน้ำมูก
- ท้องผูก หรือรู้สึกไม่สบายท้อง
- ปวดกล้ามเนื้อ
- เจ็บปวดต่อนม เต้านมโต มีของเหลวไหลจากหัวนม ประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ หรือประจำเดือนขาด

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำ ห้องครัว
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา ผงยาสีขาว อยู่ในแคปซูล สีแดง-เทา มีอักษร BIOLAB และ E บนแคปซูล
- ตัวยาสำคัญ ฟลูนาไรซีน ไฮโดรคลอไรด์ (Flunarizine hydrochloride)
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ แมกนีเซียมสเตียเรท (magnesium stearate), คอลลอยด์ซิลิคอนไดออกไซด์ (colloidal silicon dioxide), แมนนิทอล (mannitol), พรีเจลาติไนซ์สตาρχ (pregelatinized starch), แคปซูลเจลาตินแข็ง เบอร์ 4 สีแดง-เทา (red(cap)/dark gray(body) opaque, hard gelatin capsule no.4 capsule)

ผู้ผลิต บริษัท ไบโอแอลป์ จำกัด,  
625 นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ  
ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด,  
55 อาคารไบโอเฮาส์ สุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ  
โทร.0-2258-9999

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx)

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>