

**ร็อกซิโทรมัยซิน**  
**ความแรง 150 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม**  
**ชื่อการค้า ROXCIN (ร็อกซิน)**

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า ร็อกซิโทรมัยซิน มีตัวยา 150 มิลลิกรัม เป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มแอมคาโรไลด์

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้ยาในกลุ่มแอมคาโรไลด์ เช่น อีริโทรมัยซิน อะซิโทรมัยซิน
- มีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือตับที่ทำงานผิดปกติรุนแรง
- กำลังใช้ยารักษาโรคปวดหัวไมเกรนกลุ่มเออร์กอด อัลคาลอยด์ หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - หงุดหงิดท้อง หรือวางแผนที่จะตั้งท้อง
  - หงุดหงิดนมลูก
  - ตับหรือไตทำงานผิดปกติ
  - กำลังใช้ "ยา อาหารเสริม สมุนไพร" ตัวอื่นอยู่

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ตอนท้องว่าง ก่อนอาหาร 15 นาที หรือหลังอาหาร 3 ชั่วโมง

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้กับเวลามื้อต่อไป ให้รอ กินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- ห้ามหยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง ควรกินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร เพื่อผลการรักษาที่ดี
- ห้ามนำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกับท่าน

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- ท้องเสียอย่างรุนแรง มีอาการขาดน้ำ เช่น ผิวแห้ง เหี่ยว ปากซีด เหนื่อยเพลีย หมดสติ

**"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- มีฝ้าขาวในช่องปาก เจ็บที่ลิ้นและปาก
- มีอาการคันหรือเจ็บผิดปกติที่ช่องคลอด มีหนองไหล หรือตกขาวเปลี่ยนสีและมีกลิ่นผิดปกติ
- คลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายท้อง ท้องอืด
- ออยากอาหารลดลง การรับกลิ่นหรือรสเปลี่ยนไป
- ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง

**"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"**

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บในที่แห้ง อบอุ่นให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส โดย ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องนำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ยาเม็ด กลม นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านหนึ่งมีอักษร **E**
- **ตัวยาสำคัญ** ร็อกซิโทรมัยซิน (roxithromycin)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ hydroxypropyl cellulose "L" (ไฮดรอกซีโพรพิล เซลลูโลส "แอล"), docusate sodium (ดีออกคิวเซตโซเดียม), microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส), corn starch (คอร์นสตาร์ช), lactose (แลคโตส), sodium starch glycolate (โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต), colloidal silicon dioxide (คอลลอยด์ซิลิคอน ไดออกไซด์), magnesium stearate (แมกนีเซียม สเตียเรท), methocel E5 (เมโทเซลอี5), HPMC 5 cps (เฮกซ์เมทิลซี 5 เซนติพอยส์), propylene glycol (โพรพิลีนไกลคอล), titanium dioxide (ไททาเนียม ไดออกไซด์), carnauba wax (คาร์นูบา แวกซ์), isopropyl alcohol\* (ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์), purified water\* (น้ำบริสุทธิ์)

\*ระเหยไประหว่างกระบวนการผลิต

ผู้ผลิต บริษัท ไบโอบีแอล จำกัด,

625 นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไบโอบีฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด,

55 อาคารไบโอบีเอส สุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ

โทร.0-2258-9999

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2567

**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**