

คลอเบทาซอล
ความแรง 0.05 กรัม ต่อ 100 กรัม
ชนิดครีม
ชื่อการค้า CLOBET CREAM
(คลอเบท ครีม)

เป็นยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า คลอ-เบ-ทา-ซอล-โพร-พิ-โอ-เนต (clobetasol propionate) มีตัวยา 0.05 กรัม เป็นยาในกลุ่มสเตอรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อลดอาการ แดง คัน ที่เกิดจากการอักเสบบริเวณผิวหนัง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- เคยแพ้ยาอื่นในกลุ่มสเตอรอยด์
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะ ยาสเตอรอยด์แบบกินหรือยากดภูมิคุ้มกัน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค

- ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังใช้ยา
- ทายาบางๆ บริเวณที่มีอาการวันละ 1-2 ครั้ง
- ลดขนาดยาลงหรือหยุดทายาเมื่ออาการดีขึ้น
- ห้ามทายานี้ติดต่อกันเกิน 4 สัปดาห์
- ห้ามทายานี้เพื่อรักษาสิว หรือผิวหนังที่มีการติดเชื้อ
- หลีกเลี่ยงการทายาบริเวณใกล้ดวงตา ทวารหนัก อวัยวะเพศหรือผิวหนังที่มีแผลเปิด

3.2 หากลืมทายาควรทำอย่างไร

- ทายาทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปทายาในครั้งถัดไป

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ถ้ามีการกินยานี้ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
- ถ้าอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้นภายใน 2-4 สัปดาห์ ให้ไปพบแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- มีตุ่มหนอง โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคสะเก็ดเงิน
- มองเห็นไม่ชัด การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป
"ให้ไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ผิวแตกลาย
- ผิวหนังบางลง
- ปวด แสบร้อน คัน ระคายเคือง บริเวณที่ทายา
"ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ครีม สีขาว
- **ตัวยาสำคัญ** คลอเบทาซอลโพรพิโอเนต (clobetasol propionate)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ ซิทิวแอลกอฮอล์ (cetyl alcohol) ออกทิลโดเดคทานอล (octyldodecanol) กลีเซอริลโมโนสเตียเรท (glyceryl monostearate) ลิควิดพาราฟินชนิดเบา (light liquid paraffin) เมทิลพาราเบน (methylparaben) อีมัลซิไฟอิงแว็กซ์ (emulsifying wax) โพรพิลพาราเบน (propylparaben) ไวท์ปิโตรเลียม (white petrolatum) ซีโทมาโครกอล 1000 (cetomacrogol 1000) ซิตริกแอซิดโมโนไฮเดรต (citric acid monohydrate) กลีเซอริน (glycerin) โพรพิลีนไกลคอล (propylene glycol) ไดเบสึคโซเดียมฟอสเฟต, ไดเดคคาไฮเดรต (dibasic sodium phosphate, dodecahydrate) ไซเมทิกอน (simethicone) และ น้ำบริสุทธิ์ (purified water)

ผู้ผลิต บริษัท ไบโอสแตป จำกัด,
625 นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด,
55 อาคารไบโอเฮาส์ สุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ
โทร.0-2258-9999

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พฤษภาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**