

**โคลิโทรมาโซล**  
**ความแรง 100 และ 500 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ดสอดช่องคลอด**  
**ชื่อการค้า COTREN VAGINAL TABLETS**  
**(โคเทรน ชนิดเม็ดสอดช่องคลอด)**

**เป็นยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน**

**1. ยานี้คือยาอะไร**

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**  
• ยานี้มีชื่อว่า โคลิโทรมาโซล (clotrimazole)
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**  
• ใช้รักษาโรคเชื้อราในช่องคลอด

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**  
• เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้  
• ระหว่างช่วงที่มีประจำเดือน เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้**  
• ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่  
• ติดเชื้อราในช่องคลอดมากกว่า 2 ครั้ง ใน 6 เดือน  
• คุณนอนหรือคุ้กรักเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
• อายุต่ำกว่า 16 ปี หรืออายุมากกว่า 60 ปี  
• มีอาการ เช่น ตกขาวมีกลิ่นเหม็น ช่องคลอดมีเลือดออกผิดปกติ มีแผลหรือตุ่มบริเวณช่องคลอด ปวดเวลาปัสสาวะ ปัสสาวะออกยาก มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

**3. วิธีใช้ยา**

- 3.1 ยานี้ใช้ได้อย่างไร**  
• ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดของโรคและความรุนแรงของโรค

- วิธีเหน็บช่องคลอด
  1. ล้างมือให้สะอาด
  2. แกะกระดาษห่อออกแล้วจุ่มในน้ำสะอาดพอให้ยาขึ้น (ประมาณ 1-2 วินาที) เพื่อลดการระคายเคือง
  3. นอนหงายโดยชันเข่าขึ้นและแยกขาออก
  4. สอดยาเข้าช่องคลอดให้ลึกที่สุดเท่าที่ทำได้โดยใช้นิ้วหรือเครื่องช่วยสอดตัวยายาเข้าไป
  5. นอนในท่าเดิมประมาณ 15 นาที จนกว่ายาจะละลายหมด

- 3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร**  
• เหน็บยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องเหน็บยาอีกครั้งไม่ต้องเหน็บยาที่ลืม แล้วเหน็บยาครั้งต่อไปตามปกติ

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นใช้แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง เพราะอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผล
- หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อและการรักษา เพราะอาจทำให้คุณติดเชื้อได้
- หากใช้ยานี้แล้ว 7 วัน อาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้อาจลดประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์คุมกำเนิดที่ทำจากยาง เช่น ถุงยางอนามัยควรคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นอย่างน้อย 5 วันหลังใช้ยานี้

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง

- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**
- ช่องคลอดมีแผลลอก
  - คัน ระคายเคืองช่องคลอด
  - แสบร้อน เจ็บ บริเวณปากช่องคลอด
  - ตกขาว หรือ ช่องคลอดมีเลือดออก

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- **ลักษณะยา** เม็ดรูปยาวนูน ปลายมน 1 ด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร BIOLAB อีกด้านหนึ่งมีเลข 500
- **ตัวยาสำคัญ** โคลิโทรมาโซล (clotrimazole)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ โพรโอดินเค-90 (povidone K-90) คอร์นสตาร์ช (corn starch) ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส (microcrystalline cellulose) แมกนีเซียมสเตียเรท (magnesium stearate) แลคโตสโมโนไฮเดรต (lactose monohydrate) โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต (sodium starch glycolate) และน้ำบริสุทธิ์ (purified water)

ผู้ผลิต บริษัท ไบโอบีแอล จำกัด,  
625 นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ  
ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด,  
55 อาคารไบโอเฮาส์ สุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ  
โทร.0-2258-9999  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พฤษภาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**  
▪ <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>  
▪ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**