

**เอthinylestradiol 0.03 มิลลิกรัม  
ผสม drospirenone 3 มิลลิกรัม  
ชนิดเม็ด ชื่อการค้า LIPZ (ลิปซ์) และ  
LIPZ ED (ลิปซ์ อีดี)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้ชื่อว่าเอthinylestradiol (ethinylestradiol) ผสม drospirenone (drospirenone)

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- คุมกำเนิด ป้องกันการตั้งครรภ์
- รักษาสิว และ กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ หญิงตั้งครรภ์ หรือ หญิงให้นมทารก
- ⊗ เป็นโรคตับ มีเนื้องอกที่ตับ หรือตับทำงานผิดปกติ
- ⊗ เป็นหรือเคยเป็น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
- ⊗ มีภาวะเลือดออกที่ช่องคลอดผิดปกติ
- ⊗ เป็นหรือเคยเป็น โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจ
- ⊗ มีภาวะหลอดเลือดอุดตันผิดปกติ เส้นเลือดขด
- ⊗ โรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้

**2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- เป็นโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันเลือดสูง
- โรคลมชัก โรคซึมเศร้า
- ปวดหัวไมเกรน
- สูบบุหรี่ และ อายุ 35 ปี ขึ้นไป

**"สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร  
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่"**

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร หรือตามฉลากยาที่ได้รับ

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- **น้อยกว่า 48 ชั่วโมง:** กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ หากนึกได้ช่วงใกล้เวลาที่กินปกติ สามารถกินยาที่ลืมพร้อมกับยารอบปกติเป็น 2 เม็ด แล้วกินยาที่เหลือตามปกติ
- **มากกว่า 48 ชั่วโมง หรือ ลืมมากกว่า 2 เม็ด:** กินยาเม็ดที่ลืมพร้อมกับยารอบปกติ ไม่ต้องกินยาคุมเม็ดอื่นที่ลืมก่อนหน้านี้แล้วกินยาที่เหลือตามปกติ ควรใช้การคุมกำเนิด เช่น การใช้ถุงยางอนามัย จนกว่าจะกินยาคุมกำเนิดตามปกติ 7 วัน

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้จะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง เพราะอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงจากยาและการรักษาไม่ได้ผล
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรือผลจากการใช้ยา
- ควรกินยาในช่วงเวลาเดิมหรือใกล้เคียงในทุกๆ วัน
- สามารถกินยาก่อนนอน เพื่อป้องกันหรือลดอาการข้างเคียงจากยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
- เจ็บหน้าอกรุนแรง ราวมาที่แขนหรือลำคอ หายใจลำบาก
- ตัวเหลืองตาเหลือง บัสสาวะสีผิดปกติ ปวดท้อง
- ปวดขารุนแรง ขาบวมผิดปกติ
- ปวดหัวไมเกรนรุนแรง หรือปวดหัวบ่อยผิดปกติ
- มองเห็นผิดปกติ มองภาพไม่ชัด
- พุดไม่ชัด พุดลำบาก แขนขาอ่อนแรง

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีมีอาการรุนแรง**

- ปวดหัว ปวดประจำเดือนผิดปกติ
- คลื่นไส้ไม่สบายท้อง น้ำหนักเพิ่มขึ้นผิดปกติ
- ความรู้สึกทางเพศเปลี่ยน ซึมเศร้า
- คัดตึงเต้านม เต้านมบวม เจ็บเต้านม

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือและสายตาเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- สามารถดูข้อมูลลักษณะและส่วนประกอบของยานี้เพิ่มเติมได้ในเอกสารกำกับยาฉบับเต็ม
- ผู้ผลิต บริษัท ไบโอแอลป์ จำกัด**  
**จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย**  
**ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด**  
**55 อาคารไบโอเฮาส์ สุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ ประเทศไทย โทร. 0-2258-9999**

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 5 กันยายน 2567

## คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดอุดตัน และโรคตับ
2. ไม่ควรใช้ในสตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดอุดตัน เช่น มีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดอักเสบ โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
3. ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยหรือผู้ที่มีประวัติมีเนื้องอกที่ตับ และผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยเป็นมะเร็งที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ เช่น มะเร็งเต้านม หรือมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์
4. ระวังการใช้ในสตรีที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะสตรีที่อายุมากกว่า 35 ปี ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
5. กรณีที่ใช้ นอกเหนือจากเพื่อการคุมกำเนิด ให้ปรึกษาแพทย์
6. หากใช้ยาแล้วมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์