

# อัลเพลิซิบ

## ความแรง 50, 150, 200 มิลลิกรัม

### ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม

#### ชื่อการค้า Piquay (พิด-เรย์)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า อัลเพลิซิบ (alpelisib)

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาโรคมะเร็งเต้านมบางประเภทในผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - เป็นโรคเบาหวาน
  - เคยมีผื่น ผื่นหนังแดง มีตุ่มน้ำพองที่ริมฝีปาก ตา หรือปาก หรือผิวหนังหลุดลอก
  - ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรือให้นมลูก
  - กำลังใช้ยา วิตามิน หรือสมุนไพรอื่นๆ

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้วันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร
- กินยานี้เวลาเดิมของทุกวัน
- ให้กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามเคี้ยว บด หรือแบ่งเม็ดยา

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาแต่ยังไม่เกิน 9 ชั่วโมง นับจากเวลาปกติที่กินยา ให้กินยาทันที
- หากลืมกินยาเกิน 9 ชั่วโมงแล้ว หรืออาเจียนออกมา ให้ข้ามไปกินวันถัดไป และอย่ากินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร อย่าหยุดยาเอง
- หลีกเลี่ยงการขับชี่ยานยนต์ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้อ่อนเพลีย ตาพร่ามัว
- ในระหว่างใช้ยานี้ ต้องคุมกำเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัย หรือวิธีอื่นที่แพทย์แนะนำ และคุมกำเนิดต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 7 วัน หลังหยุดใช้ยานี้
- งดให้นมลูกระหว่างใช้ยานี้ และงดต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 7 วัน หลังหยุดใช้ยานี้

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ล้าคอ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจมีเสียงหวีด ไอ เวียนหัว หายใจเร็ว
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกโดยไม่ทราบสาเหตุ
- ริมฝีปาก ลิ้น หรือผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีม่วง
- หิวน้ำอย่างมาก ปากแห้ง ผื่นหนังแดง ปัสสาวะมากและบ่อย กินอาหารมากขึ้นแต่น้ำหนักลดลง คลื่นไส้ อาเจียน ลมหายใจมีกลิ่นผลไม้
- ปัสสาวะน้อย บวมที่ขาหรือข้อเท้าหรือรอบดวงตา
- อ่อนเพลีย สับสน ชัก เจ็บหน้าอก
- ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บข้อ เหนื่อยออกตอนกลางคืน น้ำหนักลด
- ชากรรไกรบวมหรือเจ็บ รู้สึกชากรรไกรหนัก ฟันโยก
- ท้องเสีย ปวดท้องอย่างมาก อุจจาระมีมูกหรือเลือด

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ตัวซีด ผม่วง ผมบาง ตาแห้ง ตาพร่ามัว
- เบื่ออาหาร รับประทานอาหารไม่ย่อย
- เป็นแผลในปาก เหนื่อย อ่อนแอ ปวดฟัน ริมฝีปากแห้งแตก
- นอนไม่หลับ กล้ามเนื้อกระตุก ปวดกล้ามเนื้อ
- ปัสสาวะแสบขัดและบ่อยกว่าปกติ
- ปวดหัว การรับรสเปลี่ยนแปลง เยื่อบุแห้ง บวมหน้า
- เจ็บในลำคอ (หลอดลม หรือหลอดอาหาร) หรือเยื่ออวัยวะเพศ

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- ห้ามใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุบนกล่อง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะของยาและตัวยาสสำคัญ ยานี้มีตัวยาสสำคัญ อัลเพลิซิบ มี 3 ความแรง ดังนี้
  - เม็ดยาเคลือบฟิล์มสีชมพูอ่อน รูปกลม นูนทั้งสองด้าน ขอบมน ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “L7” อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร “NVR” มีตัวยาส 50 มิลลิกรัม
  - เม็ดยาเคลือบฟิล์มสีแดงอ่อน รูปรี นูนทั้งสองด้าน ขอบมน ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “UL7” อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร “NVR” มีตัวยาส 150 มิลลิกรัม
  - เม็ดยาเคลือบฟิล์มสีแดงอ่อน รูปรี นูนทั้งสองด้าน ขอบมน ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “YL7” อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร “NVR” มีตัวยาส 200 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่
  - ส่วนประกอบในยาเม็ดแกน ไมโครคริสทัลไลน์ เซลลูโลส แมนนิทอล โซเดียมสเตียเรทไกลโคเลต ไฮโปรมีเซลโลส แมกนีเซียมสเตียเรต

- ส่วนประกอบในน้ำยาเคลือบฟิล์ม ไฮโปรเมล  
โลส ไอรอนออกไซด์แบล็ก ไอรอนออกไซด์เรด  
ไทเทเนียมไดออกไซด์ มาโครกอล 4000 ทัลก์

ผู้ผลิต Novartis Pharma Stein AG, Switzerland  
ผู้นำเข้า บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพ  
ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด กรุงเทพ  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 กรกฎาคม 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <https://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้  
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร