

ไรโบซิคลิน

ความแรง 200 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ด

ชื่อการค้า Kisqali (คิสคาลี)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า “ไร-โบ-ซี-คลิน ซัค-ซี-เนต” (ribociclib succinate) เป็นยาด้านมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งเต้านมบ้างประเททในผู้หญิง และผู้ชาย โดยการรักษาจะใช้ยานี้ใช้ร่วมกับยาด้านมะเร็งชนิดอื่น

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เมื่อเคยแพ้ยาที่ หรือส่วนประกอบของยาที่
- แพ้ถ้าเหลือง หรือ ถั่วลิสง
- เมื่อดังครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีไข้ เจ็บคอ มีแพลในปาก ที่เกิดจากการติดเชื้อ เพราะท่านอาจมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ
 - มีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือเคยเป็นโรคตับ
 - มีหรือเคยมีภาวะหัวใจทำงานผิดปกติ เช่น โรคหัวใจล้มเหลว โรคหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษา หรือเกิดอันตรายได้ เช่น น้ำเงือกฟรุต ยาแก้นั่ก ยาข้าวเชื้องชนิดและยาอื่น ๆ อีกหลายชนิด

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพาะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ต้องกินยาที่วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 21 วัน แล้วหยุดยาอีก 7 วัน จึงจะครบหนึ่งรอบการรักษา
- ต้องกินยาที่เวลาเดินของทุกวัน โดยทั่วไปแนะนำให้กินตอนเช้า ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
- กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามบด ห้ามหักแบ่งเม็ดยา

3.2 หาก ลืมกินยา หรืออาเจียนยาออกมาก

ควรทำอย่างไร

- รอ กินยาตามเวลาปกติในวันถัดไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้ เกินขนาด ที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้รับไปพบแพทย์ทันที โดยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และให้น้ำของยาไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ยานี้อาจทำให้มีน้ำลายมาก ระดับรังการขับขี้ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- ห้ามดังครรภ์หรือให้นมบุตรระหว่างใช้ยา และหลังหยุดใช้ยาที่วันถัดไปอย่างน้อย 21 วัน
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งที่ มีอาการผิดปกติ ที่เกิดขึ้นระหว่างใช้ยา แม้จะไม่มีอาการนั้นระบุในเอกสารนี้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- มีไข้จนหนาวสั่น มีอาการติดเชื้อ เช่น เจ็บคอ เป็นแพลในช่องปากบ่อยครั้ง
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มผิดปกติ ปวดห้องท้องที่ด้านขวาหนีอสะสมตื้อ
- เจ็บหรือแน่นหน้าอัก หัวใจเต้นผิดปกติ ใจสั่น เวียนหัว เป็นลม ปากคล้ำม่วง หายใจถี่ ขับลม “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดห้อง ท้องผูก ท้องร่วง
- เบื้องอาหาร ลิ้นรับรสผิดปกติ ห้องอีด แสนร้อน กลางอกร
- น้ำตาไหลมาก ตาแห้ง
- ปัสสาวะแสบชัดและปัสสาวะบ่อย มีไข้
- ปวดหัว ปวดหลัง
- ไอ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงแดดตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พันมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

ลักษณะ

ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีน้ำเงินออกเทาอ่อน รูปกลม นูนทั้งสองด้าน ขอบตัด ไม่มีขีดแบ่งครึ่ง เส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 11.1 มิลลิเมตร ด้านหนึ่งมีอักษร "RIC" อีกด้านหนึ่งมีอักษร "NVR"

ส่วนประกอบ

ಡอล์เม็ด ประกอบด้วยตัวยา ribociclib succinate

เทียบเท่ากับ ribociclib 200 มิลลิกรัม

ส่วนประกอบอื่นๆ ในเม็ดยา ได้แก่

Microcrystalline cellulose, Crospovidone Type A,

Low-substituted hydroxypropylcellulose,

Magnesium stearate, Colloidal anhydrous silica

ส่วนประกอบอื่นๆ ในน้ำยาเคลือบฟิล์ม ได้แก่

Iron oxide, black (E172), Iron oxide, red (E172),

Soya Lecithin (E322), Polyvinyl alcohol (partially hydrolyzed), Talc, Titanium dioxide (E171),
Xanthan gum

ผู้ผลิต Novartis Pharmaceutical Manufacturing LLC,

Ljubljana, Slovenia

ผู้นำเข้า บริษัท โนوارติส (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ โทร. 0-2080-0999

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ชีลลิค พาร์มา จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มกราคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<https://ndi.fda.moph.go.th/>