

**แอสซิมินิบ**  
**ความแรง 20, 40 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม**  
**ชื่อการค้า Scemblix (สะ-เคม-บลิกซ์)**

**1. ยานี้คืออะไร**

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า แอสซิมินิบ (asciminib) มีตัวยา 20 หรือ 40 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาต้านมะเร็ง
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางประเภทในผู้ใหญ่ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าควรใช้ยานี้

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่**
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- 2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย** ให้ออกแพทย์หากท่านมีอาการต่อไปนี้
- เคยเป็นโรคตับอ่อนอักเสบ หรือปวดท้องช่วงบนอย่างมาก
  - เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  - หญิงที่ตั้งท้อง หรือวางแผนจะตั้งท้อง หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ เพราะอาจมีอันตรายต่อทารก แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์
  - หญิงให้นมลูก ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
  - ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร  
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**3. วิธีใช้ยา**

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
  - ให้กินยาก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ไม่ควรกินยาพร้อมอาหาร
  - กินยานี้เวลาเดิมของทุกวัน
  - ให้กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามหัก เคี้ยว หรือบดเม็ดยา
- 3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร**
- กรณีที่กินยานี้วันละ 1 ครั้ง: หากลืมกินยาเกิน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาปกติที่กินยา ให้ข้ามไปกินยามื้อถัดไป
  - กรณีที่กินยานี้วันละ 2 ครั้ง: หากลืมกินยาเกิน 6 ชั่วโมงนับจากเวลาปกติที่กินยา ให้ข้ามไปกินยามื้อถัดไป
  - ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ต้องคุมกำเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัย หรือวิธีอื่นที่แพทย์แนะนำ และคุมกำเนิดต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 3 วัน หลังหยุดใช้ยานี้
- งดให้นมลูกระหว่างใช้ยานี้ และงดต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 3 วัน หลังหยุดใช้ยานี้

**คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้  
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น**

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ล้าคอ
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มี้ำตามผิวหนัง
  - ฟกช้ำง่าย หรือเลือดออกโดยไม่ทราบสาเหตุ
  - มีไข้สูง หนาวสั่น เจ็บคอ มีแผลในปาก หายใจมีเสียงหวีด ซึ่งอาจเป็นอาการของการติดเชื้อ
  - หัวใจเต้นผิดปกติ
  - ปวดหัว เวียนหัว เจ็บหน้าอก หายใจถี่ๆ
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**
- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**
- อ่อนเพลีย เหนื่อย ผิวหนังซีด
  - อาเจียน ท้องเสีย คลื่นไส้ ปวดท้อง เมื่ออาหารปวดท้องส่วนบนอย่างมาก
  - ผื่น คัน
  - ปวดกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อ
  - เหนื่อย น้ำหนักขึ้น ลักษณะของผิวหนังและเส้นผมเปลี่ยนแปลง
  - ตาพร่ามัว ตาแห้ง
  - ใจสั่น
  - สะอึก หายใจเร็ว
  - มีภาวะบวมหน้า
- “ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุบนกล่อง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา**

ความแรง 20 มิลลิกรัม : ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีเหลืองอ่อน กลม นูนทั้งสองด้าน ขอบมน ไม่มีรอยแบ่ง ด้านหนึ่งมี "โลโก้ Novartis" อีกด้านหนึ่งมีตัวเลข "20"  
ความแรง 40 มิลลิกรัม : ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาวออกม่วง กลม นูนทั้งสองด้าน ขอบมน ไม่มีรอยแบ่ง ด้านหนึ่งมี "โลโก้ Novartis" อีกด้านหนึ่งมีตัวเลข "40"

- **ตัวยาสำคัญ** แอสซิมินิบ

- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ แล็กโทสมอนไฮเดรต ไมโครคริสทัลไลน์เซลลูโลส ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส คลอสคาร์เมลลอสโซเดียม แมกนีเซียม สเตียเรต คอลลอยด์ซิลิคอนไดออกไซด์

- น้ำยาเคลือบฟิล์มของความแรง 20 มิลลิกรัม : พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ ทัลก์ เลซีทิน แชนแทนกัม ไอรอนออกไซด์เฮลโลว์ ไอรอนออกไซด์เรด

- น้ำยาเคลือบฟิล์มของความแรง 40 มิลลิกรัม : พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ ทัลก์ เลซีทิน แชนแทนกัม ไอรอนออกไซด์เรด ไอรอนออกไซด์แบล็ก

**ผู้ผลิต** Novartis Pharma Stein AG, Switzerland

**ผู้นำเข้า** บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

**ผู้แทนจำหน่าย** บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 31 พฤษภาคม 2567

**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

<https://ndi.fda.moph.go.th>