



เอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วย

ยาผงซิโธรแมกซ์™ สำหรับผสมเป็นยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน
(200 มิลลิกรัม/ 5 มิลลิลิตร)
ZITHROMAX™ (Powder for Oral Suspension 200 mg/ 5ml)
อะซิโธรมัซซิน (Azithromycin)

โปรดอ่านเอกสารนี้ให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนเริ่มรับประทานยา

- เอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยนี้รวบรวมข้อมูลสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยานี้ ไม่ได้มีข้อมูลยาครบถ้วนหรือทดแทนการดูแลโดยแพทย์หรือเภสัชกร ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม หรือเกิดอาการข้างเคียงใด ๆ รวมถึงอาการที่ไม่เคยปรากฏในเอกสารนี้ หรือมีอาการรุนแรงหรือร้ายแรงขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ให้ใช้สำหรับคุณเท่านั้น ห้ามให้ยานี้แก่ผู้อื่นแม้ว่าจะมีอาการเหมือนกันเพราะอาจเป็นอันตรายได้

This leaflet answers some common questions about this medicine. It does not contain complete drug information and cannot substitute for professional care. If you have any questions or suspect that you have adverse drug reactions, please contact your pharmacist or physician.

This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others because it may harm them.

1. ยาซิโธรแมกซ์คือยาอะไร และใช้รักษาในกรณีใด

ยาซิโธรแมกซ์ มีตัวยาสำคัญคือ อะซิโธรมัซซิน 200 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร ยาอะซิโธรมัซซินเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมโครไลด์ (macrolides) มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อจุลินทรีย์อื่น ๆ ที่ไวต่อยานี้

โดยทั่วไปแพทย์จะสั่งใช้ยาซิโทรแมกซ์เพื่อรักษาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ทอนซิลอักเสบ คอหอยอักเสบ ไช้น้ำอักเสบและการติดเชื้อในหูชั้นกลางเฉียบพลัน ตลอดจน การติดเชื้อทางทันตกรรมและช่องปาก การติดเชื้อบริเวณผิวหนัง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งไม่มี ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อคลามีเดียหรือเชื้อ Neisseria หรือ รักษาแผลริมอ่อน

2. ก่อนรับประทานยาซิโทรแมกซ์

ห้ามรับประทานยาซิโทรแมกซ์ในกรณีต่อไปนี้

แพ้ยาอะซิโทรมัยซิน หรือ ยาปฏิชีวนะอื่นในกลุ่ม macrolide หรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในเม็ดยา ได้แก่ น้ำตาลซูโครส โซเดียมฟอสเฟตชนิดไตรเบสึคแอนฮัยดรัส ไฮดร็อกซีโพรพิลเซลลูโลส xanthan gum และ สารแต่งกลิ่นสังเคราะห์

ข้อควรระวังในการรับประทานยาซิโทรแมกซ์ชนิดผงสำหรับผสมเป็นยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน มีน้ำตาลซูโครสเป็นส่วนประกอบ หากเคยได้รับการวินิจฉัยว่าคุณแพ้น้ำตาลบางชนิด หรือต้องควบคุม ปริมาณน้ำตาล ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนรับประทานยานี้

ผู้ที่ควรระมัดระวังหากต้องรับประทานยาซิโทรแมกซ์

- รับประทานยากกลุ่ม ergot
- เป็นโรคตับ
- ผู้ป่วยที่ไตทำงานบกพร่องอย่างรุนแรง
- ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะการเต้นของหัวใจช่วง QT ที่ยาวขึ้น (เช่น ได้รับการรักษาด้วยยาอื่นที่ทำให้เกิดช่วง QT ที่ยาวขึ้น ได้แก่ ยารักษาโรคจิตเภท ยาต้านอาการซึมเศร้า เป็นต้น) ผู้ป่วยที่หัวใจเต้นช้าอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิก หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะหรือหัวใจล้มเหลว
- ผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

การรับประทานยาซิโทรแมกซ์ร่วมกับยาอื่น

ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งหากคุณเพิ่งใช้หรือกำลังใช้ยาอื่น ๆ ร่วมด้วย แม้จะไม่ใช่ยาที่ได้สั่งโดยแพทย์ก็ตาม ยาที่อาจถูกรบกวนจากการใช้ยาซิโทรแมกซ์ หรืออาจมีผลต่อการทำงานของยาซิโทรแมกซ์ ได้แก่ digoxin (ยารักษาโรคหัวใจ) colchicine (ยารักษาโรคเก๊าท์) ยา ergot (ใช้รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน) ยาต้านการจับตัวเป็นลิ่มของเลือดประเภท Coumarin ชนิดรับประทาน (เช่น วาร์ฟาริน) ยา cyclosporine (ใช้กดภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและรักษาการต้านของอวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่ายหรือไขกระดูกที่ได้รับการปลูกถ่าย) ยาลดกรด ยารักษาการติดเชื้อบางตัว เช่น ไรฟาบูติน (rifabutin)

หญิงมีครรภ์

ไม่แนะนำให้รับประทานยาซิโทรแมกซ์ในระหว่างมีครรภ์ เว้นเสียแต่แพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่มียาอื่นให้
เลือกใช้แทน ในหญิงที่มีโอกาสมีครรภ์หรือหากคุณวางแผนที่จะมีครรภ์ในขณะที่รับประทานยาซิโทรแมกซ์
ควรปรึกษาแพทย์

หญิงให้นมบุตร

ไม่แนะนำให้รับประทานยาซิโทรแมกซ์ในระหว่างให้นมบุตร เว้นเสียแต่แพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่มียาอื่นให้
เลือกใช้แทน

ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะและควบคุมเครื่องจักรกล

ยังไม่มีข้อมูลของยาซิโทรแมกซ์เกี่ยวกับผลต่อความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะหรือควบคุม
เครื่องจักรกล ดังนั้นหากมีอาการมึนงง หรือเวียนศีรษะ ห้ามขับรถหรือใช้เครื่องจักรกล

3. การรับประทานยาซิโทรแมกซ์

ขนาดรับประทานของยาซิโทรแมกซ์ชนิดผงสำหรับผสมเป็นยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทานขึ้นกับ
ชนิดและความรุนแรงของโรค แพทย์จะเป็นผู้สั่งยาที่เหมาะสมกับอาการของคุณ จึงควรรับประทานยา
ตามที่แพทย์สั่งเสมอ ควรรับประทานยาให้ครบตามที่แพทย์สั่งถึงแม้ว่าคุณจะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม

ขนาดรับประทานโดยทั่วไป สำหรับเด็กของยาซิโทรแมกซ์ชนิดผงสำหรับผสมเป็นยาน้ำแขวนตะกอน
สำหรับรับประทานคือ 10 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละครั้งเป็นเวลา 3 วัน หรือตามแพทย์สั่ง
โดยควรให้ยาอย่างช้า ๆ ขณะที่อยู่ในท่านั่งหรือยืน เพื่อหลีกเลี่ยงการสำลัก

ยาซิโทรแมกซ์ชนิดผงสำหรับผสมเป็นยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทานสามารถรับประทานพร้อม
อาหารหรือไม่ก็ได้ แต่หากจำเป็นต้องรับประทานยาลดกรดด้วย ควรรับประทานยาซิโทรแมกซ์ ก่อน
รับประทานยาลดกรด 1 ชั่วโมงหรือหลังรับประทานยาลดกรดแล้ว 2 ชั่วโมง

คำแนะนำในการผสมยาซิโทรแมกซ์ชนิดผงสำหรับผสมเป็นยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับ
รับประทาน

- กรณีได้รับยาที่บรรจุในขวด ควรปฏิบัติดังนี้

1. เคาะขวดให้ผงยากระจาย ไม่จับตัวเป็นก้อน กดฝาขวดพร้อมหมุนตามลูกศรเพื่อเปิดขวด
2. ตวงน้ำให้ถึงขีดบนถ้วยตวงที่ให้มาในกล่อง (9 มิลลิลิตร) เทลงในขวดเพียงครั้งเดียว
เขย่ายาให้ละลายเข้ากัน
3. เขย่าขวดทุกครั้งก่อนรินยาออกมารับประทาน

หากคุณรับประทานยาซิโทรแมกซ์มากกว่าที่แพทย์สั่ง

หากคุณรับประทานยาซิโทรแมกซ์ในปริมาณมากกว่าที่แพทย์สั่ง (หรือมีผู้อื่นรับประทานยาของคุณ) ควรปรึกษาแพทย์โดยทันทีและหากแพทย์แนะนำให้ไปโรงพยาบาลให้นำยาที่เหลือหรือกล่องยาไปด้วยแม้ว่าจะมียาเหลืออยู่หรือไม่ก็ตาม อย่ารับประทานยาต่อจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์

หากคุณลืมรับประทานยาซิโทรแมกซ์

หากคุณลืมรับประทานยาซิโทรแมกซ์ให้รับประทานยานี้ทันทีที่นึกได้ หากนึกได้ใกล้ระยะเวลารับประทานยาในครั้งถัดไปให้รับประทานยาในครั้งถัดไปให้ตรงเวลา ห้ามรับประทานยาเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อทดแทนการลืมรับประทานยาครั้งที่ผ่านมา และไม่ควรรับประทานยาเกินกว่าวันละ 1 ครั้ง

การหยุดยาซิโทรแมกซ์

หากคุณหยุดยาซิโทรแมกซ์ก่อนที่แพทย์กำหนด เชื้ออาจกำเริบขึ้นมาใหม่ได้ ไม่ต้องกังวลหากคุณรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งแล้วยังไม่รู้สึกดีขึ้น ยายังคงออกฤทธิ์ฆ่าเชื้ออยู่ถึงแม้คุณจะหยุดรับประทานยาแล้วก็ตาม หากคุณยังไม่รู้สึกดีขึ้นใน 2-3 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรักษา ควรกลับไปพบแพทย์

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

เช่นเดียวกับยาอื่น ๆ ยาซิโทรแมกซ์อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อไปนี้ในบางคน

อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อย ได้แก่ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระเหลว ท้องเสีย ท้องอืด

หากคุณมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หลังจากรับประทานยา ถึงแม้ว่าอาการอาจเกิดขึ้นน้อยมากแต่อาจมีความรุนแรง ให้หยุดรับประทานยาซิโทรแมกซ์และไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด:

- หอบหืด มีเสียงหายใจหวีด หายใจถี่ หายใจลำบาก
- หัวใจเต้นเร็วหรือผิดจังหวะ
- ผื่นแดงอักเสบที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ที่ริมฝีปาก ตา ปาก จมูก หรืออวัยวะเพศ
- มีผิวลอกรุนแรง มีเลือดออก

5. คำแนะนำในการเก็บยาซิโรแมกซ์

ควรเก็บยาซิโรแมกซ์ชนิดผงสำหรับผสมเป็นยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทานไว้ในภาชนะบรรจุเดิม จนกว่าจะถึงเวลารับประทานยา

ควรเก็บยาไว้ในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิไม่เกินที่ระบุไว้บนภาชนะบรรจุและเก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามใช้ยาหลังวันสิ้นอายุของยาที่แสดงไว้บนฉลาก หากไม่ระบุเป็นอย่างอื่น วันสิ้นอายุของยาหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนที่แสดงบนฉลาก

ยาซิโรแมกซ์ชนิดผงสำหรับผสมเป็นยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทานที่บรรจุในขวดเมื่อผสมแล้ว หากใช้ไม่หมดในระยะเวลา 10 วัน ให้ทิ้งยาที่เหลืออยู่ที่ทันที

6. ชื่อผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
2. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้

ข้อมูลในเอกสารกำกับยานี้เป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับยาซิโรแมกซ์ชนิดผงสำหรับผสมเป็นยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทานเท่านั้น