

ทราสทูซูแมบ
ขนาด 150 และ 440 มิลลิกรัม
ชนิดผงสำหรับละลาย
เพื่อหยดเข้าหลอดเลือดดำ
ชื่อการค้า TRAZIMERA™ (ทราซิมเรา™)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ทราสทูซูแมบ (Trastuzumab)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมในผู้ใหญ่ที่มีระดับโปรตีนชนิดเซอรุ่มมากกว่าปกติ
- ใช้รักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในผู้ใหญ่ที่มีระดับโปรตีนชนิดเซอรุ่มมากกว่าปกติ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- ห้ามใช้เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของยานี้
- ห้ามใช้ในผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจให้ออกซิเจน หรือมีอาการหายใจลำบากอย่างรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังการใช้ยานี้
 - หญิงให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
 - มีประวัติเป็นโรคหัวใจล้มเหลว โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ
 - เป็นโรคความดันโลหิตสูง
 - มีอาการหายใจลำบาก เช่น เหนื่อยหอบ หายใจไม่ออก หายใจไม่ทัน หายใจไม่เต็ม
- แจ้งแพทย์และเภสัชกรเสมอว่ากำลังใช้ ยา หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรชนิดใดอยู่บ้าง เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันซึ่งมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้เป็นยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ท่านจะได้รับยานี้โดยแพทย์หรือพยาบาลเท่านั้น

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที หากท่านลืมมาฉีดยา หรือไม่พบแพทย์ตามนัด

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ยานี้ใช้เวลา 7 เดือนในการขับยาออกจากร่างกายจนหมดดังนั้น
 - ผู้หญิงควรคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้ และหลังหยุดยานี้ ให้คุมกำเนิดต่อไปอีก 7 เดือน เพราะยานี้ อาจเป็นพิษต่อทารก
 - หยุดให้นมบุตรระหว่างใช้ยานี้ และหลังหยุดยานี้ ให้หยุดให้นมต่อไปอีก 7 เดือน เพราะยานี้ อาจเป็นพิษต่อทารก
 - หากท่านต้องใช้ยาอื่น ควรแจ้งแพทย์และเภสัชกรว่าเคยได้รับยานี้
- แจ้งแพทย์ทันทีหากตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ในระหว่างใช้ยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- หายใจสั้น หายใจลำบาก ไอ ใจสั่น นอนราบไม่ได้ หน้าบวม แขนขา ข้อมือบวม เวียนศีรษะ บ้านหมุน ไม่รู้สึกตัว น้ำหนักตัวเพิ่ม 2 กิโลกรัมใน 24 ชั่วโมง

**"หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที"**

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นและให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- ไข้ หนาวสั่น มีผื่นขึ้น ไอ
 - คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย น้ำหนักลด
 - ปวดหัว นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย
- "ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร"**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล จะไม่ได้รับกลับบ้าน
- หากได้รับยากลับบ้าน อย่าแกะออกจากกล่องกระดาษที่มากับผลิตภัณฑ์
- เก็บยาในตู้เย็นช่องธรรมดา อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา: พงยาสีขาว
- ตัวยาสาคัญ: ทราสทูซูแมบ
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ แอล-ฮิสทีดิน ไฮโดรคลอไรด์ แอล-ฮิสทีดิน ซูโครส พอลิซอร์เบต 20

คำเตือน: ยานี้ อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

ผู้ผลิต Pfizer Manufacturing Belgium NV
ประเทศเบลเยียม

ผู้นำเข้า บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร**