

โนนาค็อกแอลฟา ความแรง 250, 500, 1000 และ 2000 หน่วยสากล ชนิดผงพร้อมตัวทำละลาย สำหรับฉีด ชื่อการค้า BeneFIX™ (เบเนฟิกซ์™)

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โน-นา-ค็อก-แอล-ฟา (nonacog alfa) ความแรง 250, 500, 1000 หรือ 2000 หน่วยสากล
- เป็นยาในกลุ่ม โปรตีนช่วยการแข็งตัวของเลือด ชนิดแฟคเตอร์ 9

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาและป้องกันภาวะเลือดออกในผู้ป่วยโรคเลือดออกผิดปกติ (โรคฮีโมฟีเลีย) ชนิดบี

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีประวัติแพ้โปรตีนจากหนูแฮมสเตอร์

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
เมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้

- การทำงานของตับบกพร่อง
- มีโรคหัวใจ
- เพิ่งได้รับการผ่าตัด
- ต้องจำกัดปริมาณโซเดียมจากอาหาร
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

**ยานี้เป็นยาควบคุมพิเศษ การใช้ยามีความเสี่ยง
ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น**

3. วิธีใช้ยา

3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้ท่าน
- แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร จะสอนวิธีฉีดยาให้ก่อนเมื่อทำเป็นแล้วค่อยไปฉีดเองที่บ้าน
- ยานี้ใช้สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำเท่านั้น

3.2. หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ติดต่อแพทย์ทันที หากท่านลืมไปฉีดยาตามนัดหมาย

3.3. ถ้าสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาดควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้รับยาน้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หากฉีดยาไปแล้วยังมีอาการเลือดออกอยู่ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1. อาการที่ต้องไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือ มีจ้ำตามผิวหนัง
- ริมฝีปากและเหงือกมีสีคล้ำ
- ปวด แดง บริเวณที่ให้ยา
- ปวด บวม แดง ร้อน ที่ขา ซึ่งอาจจะเป็นอาการของภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

“ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

5.2. อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามี อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว ไอ มีไข้
- เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน การรับรสเปลี่ยนแปลงไป
- เจ็บหน้าอก
- ง่วงนอน ตัวสั่น
- หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำ
- การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป

“ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาน้อย่างไร

- โดยทั่วไปยานี้จะถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับยานี้กลับบ้าน
- หากท่านต้องเก็บยานี้ด้วยตนเอง เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
- ห้ามเก็บยาและบรรจุภัณฑ์ในช่องแช่แข็ง
- ในกรณีที่เก็บยานอกตู้เย็น ยาจะมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่เอาออกจากตู้เย็น เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสง โดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ยาที่ผสมน้ำเกลือแล้วให้ใช้ทันทีหรือภายใน 3 ชั่วโมง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** ในกล่องยา 1 กล่อง ประกอบด้วย
 1. ขวดแก้วบรรจุผงยา ผงสีขาวถึงสีขาวนวล
 2. น้ำเกลือสำหรับผสมยา
 3. ชุดอุปกรณ์สำหรับฉีดยา

โดยแถบสีบนกล่องยาจะบอกความแรงของยา ดังนี้

- แถบสีเหลือง ความแรง 250 หน่วยสากล
- แถบสีฟ้า ความแรง 500 หน่วยสากล
- แถบสีเขียว ความแรง 1000 หน่วยสากล
- แถบสีแดง ความแรง 2000 หน่วยสากล

- **ตัวยาสําคัญ** คือ โนนาค็อกแอลฟา
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ ซูโครส, ไกลซีน, แอล-ฮิสทีดิน, โพลีซอร์เบต80, กรดไฮโดรคลอริก, ก๊าซไนโตรเจน, โซเดียมคลอไรด์ และน้ำสำหรับฉีด

ผู้ผลิต Wyeth Farma S.A. ประเทศสเปน
ผู้นำเข้าบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 พฤษภาคม 2566
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
<https://ndi.fda.moph.go.th>