

ไอซาวูโคนาโซล
ความแรง 200 มิลลิกรัม
ชนิดผงสำหรับฉีด
ชื่อการค้า CRESEMBA™(เครสเซมบา™)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า ไอซาวูโคนาโซล (isavuconazole) เป็นยาในกลุ่มยาต้านเชื้อรา

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาโรคติดเชื้อราบางชนิดในผู้ใหญ่ที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้ ได้แก่ โรคแอสเพอร์จิลโลซิส และโรคมิวคอร์ไมโคซิส

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีประวัติคลื่นไฟฟ้าหัวใจควิที (QT) ผิดปกติ
- ห้ามใช้ร่วมกับยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น คีโโทโคนาโซล, ริโทนาเวียร์, เอฟาเวียเรนซ์, เอทราเวอริน, ไรแฟมพิซิน, ไรฟามูติน, คาร์บามาเซพีน, ฟิโนบาร์บิทัล, เฟนิโทอิน, นาฟซิลลิน, สมุนไพรเซนต์จอห์นเวิร์ต

“หากไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาดังกล่าวหรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- เคยแพ้ยาต้านเชื้อราชนิดอื่น
- เป็นโรคตับรุนแรง
- กำลังตั้งท้อง หรือให้นมลูก
- กำลังใช้ยาอื่น อาหารเสริม หรือสมุนไพรอยู่

“ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้กับท่าน
- ยานี้ใช้สำหรับหยดเข้าหลอดเลือดดำเท่านั้น

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ติดต่อแพทย์ทันที หากท่านลืมไปฉีดยาตามนัดหมาย

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงการขับรถ การทำงานกับเครื่องจักรกลหรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ อาจทำให้มึนงง อ่อนเพลีย ง่วงซึม สับสน เป็นลม

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- ตัวเหลืองตาเหลือง เบื่ออาหาร บัสสาวะสีเข้ม
- บัสสาวะไม่ออกหรือน้อยลง แขนขาบวม
- ช้ำ มีอาการสับสน หรือเพ้อ
- รู้สึกซึมเศร้า
- เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ

“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- ปวดหัว มึนงง กระสับกระส่าย ง่วงนอน
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง ปวดหลัง
- มีอาการชา หรือปวดคล้ายเข็มทิ่ม
- มีอาการคัน
- นอนหลับยาก

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้จะเก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- หากท่านต้องเก็บยานี้ด้วยตนเอง เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิม ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** ขวดแก้วบรรจุก่อนผงยาสีขาวถึงสีเหลือง
- ตัวยาสาคัญ** ไอซาวูโคนาโซล 200 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ แมนนิทอลและกรดซัลฟิวริก

ผู้ผลิต บริษัท Baxter Pharmaceutical Solutions, LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้า บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 11 เมษายน 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

▪ <https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

▪ <https://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือน ยานี้เป็นยาควบคุมพิเศษ การใช้ยามีความเสี่ยง ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

PIL Title: Isavuconazole – Cresemba powder for infusion

PIL rev.no.: 2.1

Country: Thailand

Reference: LPD rev. no. 4.0 and EU SmPC, date: December 19, 2022

PIL Revision no: 2.1

PIL date: April 11, 2024

Country: Thailand