

ทาลาโซพาริบ ความแรง 0.25 และ 1 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูลแข็ง ชื่อการค้า TALZENNA (ทาลเซนนา)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า ทาลาโซพาริบ (talazoparib) เป็นยาในกลุ่มยาต้านมะเร็ง
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้เพื่อรักษา โรคมะเร็งเต้านมที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับไต
 - หากท่านสามารถตั้งครรภ์ได้ บุคลากรทางการแพทย์ อาจทำการตรวจการตั้งครรภ์ ก่อนที่ท่านจะเริ่มการรักษาด้วยยานี้
 - หญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ เพราะยาสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์และอาจทำให้แท้งได้
 - ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงให้นมลูกหรือวางแผนที่จะให้นมลูก
 - ยานี้อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการเจริญพันธุ์ในเพศชาย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการมีลูกได้ในเพศชาย โปรดขอคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์หากท่านมีความกังวลในประเด็นนี้
 - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่

คำเตือน: ยานี้ อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - กินยานี้ วันละ 1 ครั้ง
 - สามารถกินยานี้พร้อมหรือไม่พร้อมกับอาหารก็ได้
 - กลืนยานี้ทั้งแคปซูล โปรดอย่าละลายหรือเปิดแคปซูลของยานี้
 - บุคลากรทางการแพทย์อาจเปลี่ยนขนาดยา หรือแจ้งท่านให้หยุดใช้ยา โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าท่านตอบสนองต่อการรักษา มากน้อยเพียงใด
 - หากอาเจียนหลังกินยา อย่ากินยาเพิ่ม โปรดกินยาครั้งถัดไปตามเวลาปกติ
- 3.2 หากลืมนกินยาควรทำอย่างไร**
- หากท่านลืมนกินยานี้ โปรดกินยาครั้งถัดไปตามเวลาปกติ ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเองและให้กินยาต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เพราะยานี้อาจทำให้อ่อนล้า อ่อนเปลี้ย หรือมีมึนงง
- ควรทราบข้อมูลของยาและรายการยาที่ท่านใช้ เพื่อแสดงให้บุคลากรทางการแพทย์และเภสัชกรดูในแต่ละครั้งที่รับยาใหม่ หากท่านไม่แน่ใจว่าได้รับยาเหล่านั้นอยู่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ท่านไม่ควรตั้งครรภ์ในระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยยานี้
- หญิงต้องคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้ และหลังจากหยุดยานี้ อย่างน้อย 7 เดือน
- ชายต้องคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้ และหลังจากหยุดยานี้ อย่างน้อย 4 เดือน
- โปรดแจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบในทันที หากท่านตั้งครรภ์ หรือเกิดตั้งครรภ์ในระหว่างที่ได้รับยานี้
- หลีกเลี่ยงการให้นมลูกในระหว่างการใช้ยานี้ และนับไปอีกอย่างน้อย 1 เดือน หลังการหยุดยา
- โปรดขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดในการให้นมลูกของท่านในระหว่างช่วงเวลานี้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
 - ไข้สูง หายใจสั้น หายใจลำบาก รู้สึกเหนื่อยล้า ผื่นขีด หรือหัวใจเต้นเร็ว ปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือด จ้ำเลือด หรือเลือดออกเป็นระยะอย่างผิดปกติ
 - จำนวนเม็ดเลือดผิดปกติเนื่องจากไขกระดูกมีปัญหารุนแรง **"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**
- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**
- ไม่อยากอาหาร ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ผม่วง ปวดศีรษะ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** มี 2 ความแรง ดังนี้
 - ความแรง 0.25 มิลลิกรัม: แคปซูลชนิดแข็ง ปลอดภัย แคปซูลสีขาวขุ่น (พิมพ์ "Pfizer" สีดำ) และตัวแคปซูลสีขาว (พิมพ์ "TLZ 0.25" สีดำ)
 - ความแรง 1 มิลลิกรัม: แคปซูลชนิดแข็ง ปลอดภัย แคปซูลสีแดงอ่อน (พิมพ์ "Pfizer" สีดำ) และตัวแคปซูลสีขาว (พิมพ์ "TLZ 1" สีดำ)
 - ตัวยาสำคัญ** ทาลาโซพาริบ ทอซีเลท 0.25 และ 1 มิลลิกรัม
 - ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ ซิลิซิไฟด์ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส (silicified microcrystalline cellulose (SMCC))
- ผู้ผลิต Pfizer Manufacturing Belgium NV ประเทศเบลเยียม
ผู้รับอนุญาต บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด กรุงเทพมหานคร
- เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ** กรกฎาคม 2567
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
- https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx
 - https://ndi.fda.moph.go.th/