



คู่มือการใช้ยาสำหรับผู้ป่วย

ยาเม็ดเคลือบฟิล์มแพ็กซีโลวิด ขนาด 150 มิลลิกรัม/100 มิลลิกรัม
เนอร์มาเทรลเวียร์/ริโทนาเวียร์

▼ ยานี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ค้นพบใหม่ ท่านสามารถช่วยได้โดยการรายงานผลข้างเคียงใด ๆ ที่ท่านอาจมี โปรดดูท้ายหัวข้อที่ 4 เกี่ยวกับการรายงานผลข้างเคียง

โปรดอ่านคู่มือการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยนี้ทั้งหมดให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนเริ่มรับประทานยาเพราะเอกสารนี้มีข้อมูลสำคัญสำหรับท่าน

- โปรดเก็บเอกสารฉบับนี้ไว้ ท่านอาจต้องอ่านข้อมูลนี้อีกครั้ง
- หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม โปรดถามแพทย์หรือเภสัชกรของท่าน
- ยานี้ให้ใช้สำหรับท่านเท่านั้น ห้ามให้ยานี้แก่ผู้อื่น แม้ว่าจะมีอาการแสดงของโรคที่เหมือนกันกับอาการของท่านเพราะอาจเป็นอันตรายได้
- หากท่านประสบผลข้างเคียงใด ๆ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นใด ๆ ที่ไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารกำกับยาฉบับนี้ โปรดดูหัวข้อ 4

เอกสารฉบับนี้มีข้อมูลใดบ้าง

1. แพ็กซีโลวิดคืออะไรและใช้เพื่ออะไร
2. ข้อควรระวังก่อนใช้แพ็กซีโลวิด
3. วิธีใช้แพ็กซีโลวิด
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. ควรเก็บแพ็กซีโลวิดอย่างไร
6. ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์และข้อมูลอื่น ๆ

1. แพ็กซีโลวิดคืออะไรและใช้เพื่ออะไร

แพ็กซีโลวิดเป็นยาต้านไวรัสที่ใช้สำหรับรักษาโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่ต้องการออกซิเจนเสริมและเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลุกลามไปเป็นโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง

โรคโควิด-19 เกิดจากเชื้อไวรัส แพ็กซีโลวิดออกฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสในเซลล์และการยับยั้งนี้ได้หยุดการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสในร่างกาย ซึ่งช่วยให้ร่างกายของท่านสามารถต่อสู้กับการติดเชื้อไวรัส และอาจช่วยให้ท่านมีอาการดีขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้น

แพ็คเกจโควิดมีส่วนประกอบของ เนอร์มาเทรลเวียร์ และริโทนาเวียร์เป็นตัวยาสำคัญ เนอร์มาเทรลเวียร์ เป็นตัวยาสำคัญที่ต้านเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 ริโทนาเวียร์ช่วยให้ผลการรักษาของ เนอร์มาเทรลเวียร์ ยาวนานขึ้น

แพ็คเกจโควิดใช้ในผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ยาใช้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลุกลามไปเป็นโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง รวมถึงการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตเท่านั้น

ท่านจะต้องขอคำปรึกษาจากแพทย์หากท่านรู้สึกว่ามีอาการไม่ดีขึ้นหรือหากท่านรู้สึกว่ามีอาการแย่ลงในระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยแพ็คเกจโควิด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้แพ็คเกจโควิด

ห้ามใช้แพ็คเกจโควิด

- หากท่านแพ้ เนอร์มาเทรลเวียร์ ยาริโทนาเวียร์ หรือส่วนผสมอื่นใดของยานี้ (ดังที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อที่ 6)
- หากท่านเป็นโรคตับหรือโรคไตขั้นรุนแรง
- หากท่านกำลังใช้ยาชนิดใดต่อไปนี้ การรับประทานยาแพ็คเกจโควิดร่วมกับยาเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต หรือมีผลต่อการออกฤทธิ์ของแพ็คเกจโควิดได้:
 - อัลฟูโซซิน (ยาที่ใช้ในการรักษาอาการของโรคต่อมลูกหมากโต)
 - ราโนลาซีน (ยาที่ใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง [อาการเจ็บหน้าอก])
 - เนราทีนิบ เวโนโทแคลลิกซ์ (ยาที่ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็ง)
 - อะมิโอดาโรน เบพริดีล โดรนิดาโรน เอ็นเคนไนด์ ฟลิเคไนด์ โพรพาฟีโนน ควินิดีน (ยาที่ใช้เพื่อรักษาความผิดปกติของหัวใจและแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ)
 - ฟูซิดิก แอซิด (ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย)
 - โคลชิซิน (ยาที่ใช้เพื่อรักษาโรคเกาต์)
 - แอสทีมิโซล เทอร์ฟินาติน (ยาที่ใช้รักษาอาการแพ้)
 - ลูราซิโดน พิโมไซด์ (ยาที่ใช้เพื่อรักษาโรคจิตเภท)
 - ควิโทอะปิน (ยาที่ใช้เพื่อรักษาโรคจิตเภท โรคอารมณ์สองขั้ว โรคซึมเศร้าที่มีอาการรุนแรง และอาการที่มีความคิดหรือความรู้สึกที่ผิดปกติ)
 - ไฮโดลโดซิน (ยาที่ใช้เพื่อรักษาโรคต่อมลูกหมากโต)
 - อีฟลิริโนน ไอบาบราติน (ยาที่ใช้เพื่อรักษาโรคหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้เพียงพอไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย)
 - ไดไฮโดรเออร์โกตามีน เออร์โกตามีน ฮีลิทริปแทน ยูโบรจีแฟนท์ (ยาที่ใช้เพื่อรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน)
 - เออร์โกโนวิน เมทิลเออร์โกโนวิน (ยาที่ใช้เพื่อหยุดการมีเลือดออกมากเกินไปซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังการคลอดบุตรหรือการแท้ง)
 - ซิซาไพรด์ (ยาที่ใช้เพื่อบรรเทาปัญหาทางกระเพาะอาหารบางประเภท)

- โวโคลสปอริน (ยาที่ใช้เพื่อลดการตอบสนองภูมิคุ้มกันเฉพาะ)
 - โลวาสแตติน ซิมวาสแตติน โลมิทาไพด์ (ยาที่ใช้ในการลดระดับของคอเลสเตอรอลในเลือด)
 - โฟนเรโนน (ยาที่ใช้รักษาโรคไตเรื้อรัง)
 - นาลอกซีกอล (ยาที่ใช้รักษาท้องผูกในผู้ป่วยที่ได้รับยาแก้ปวดกลุ่ม opioid)
 - เอวานาฟิล วาร์เดนาฟิล (ยาที่ใช้รักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ [หรือที่รู้จักในชื่อการไร้สมรรถภาพทางเพศ])
 - ซิลเดนาฟิล (เรวาติโอ®) ซึ่งใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดแดงปอด (ความดันเลือดสูงในหลอดเลือดแดงในปอด)
 - ไตรอาโซแลม มิตาโซแลม ซนิตรับประธาน (ยาที่ใช้สำหรับบรรเทาอาการวิตกกังวล และ/หรือมีปัญหในการนอนหลับ)
 - ฟลิแบนเซริน (ยาที่ใช้รักษาอาการความต้องการทางเพศลดลงในผู้หญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือน)
 - โทลแวนแพแทน (ยาที่ใช้รักษาซิสต์ที่ไต)
 - คาร์บามาเซพีน ฟิโนบาร์บิทัล เฟนิโทอิน ไพรมิโดน (ยาที่ใช้เพื่อป้องกันและควบคุมอาการชัก)
 - ไรแฟมพิซิน (ยาที่ใช้ในการรักษาวัณโรค)
 - ลูมากาฟตอร์ ไอวากาฟตอร์ (ยาที่ใช้รักษาโรคซิสติก ไฟโบรซิส)
 - เซนต์ จอห์นส เวิร์ต (*ไฮเพอริคัม เพอร์ฟอรัทัม*) (ยาสมุนไพรที่ใช้สำหรับอาการซึมเศร้าและวิตกกังวล)
- แพ็กซ์โลวิด ไม่ให้ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 5 วันเนื่องจากยังไม่มีการศึกษาถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาในกรณีใช้นานกว่านี้
 - แพ็กซ์โลวิด ไม่ให้ใช้ในกรณีเพื่อก่อนหรือหลังการสัมผัสเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
 - แพ็กซ์โลวิด ไม่ให้ใช้ในกรณีข้อบ่งชี้อื่นใดที่ไม่ใช่การรักษาโรคโควิด-19

คำเตือนและข้อควรระวัง

ปฏิกิริยาการแพ้

ปฏิกิริยาการแพ้ รวมถึงปฏิกิริยาการแพ้รุนแรง (รู้จักในชื่อ “anaphylaxis”) และปฏิกิริยาที่ผิวหนังรุนแรง (รู้จักในชื่อ “toxic epidermal necrolysis” และ “Stevens Johnson syndrome”) สามารถเกิดขึ้นในผู้ที่ได้รับแพ็กซ์โลวิด แม้หลังจากได้รับเพียง 1 dose ให้หยุดแพ็กซ์โลวิดและโทรศัพท์หาแพทย์ทันที หากท่านมีอาการของปฏิกิริยาการแพ้ดังต่อไปนี้:

- มีปัญหาการกลืนหรือการหายใจ
- บวมที่ลิ้น ปาก และใบหน้า
- อึดอัด/แน่นที่คอ
- เสียงแหบ
- ผิวน้ำแดงและปวด
- ผิวน้ำเป็นตุ่มพองและหลุดลอก
- เป็นตุ่มพองหรือปวดในปากหรือริมฝีปาก

ความเสี่ยงของการพัฒนาการติดยาต่อเชื้อเอชไอวี-1

หากท่านติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ได้รับการรักษาหรือไม่สามารถควบคุมได้ แพ้กซ์โลวิดอาจทำให้ยารักษาเอชไอวีบางตัวออกฤทธิ์ได้ไม่ดีในอนาคต

โรคตับ

โปรดแจ้งให้ผู้ที่ให้บริการทางการแพทย์ทราบหากท่านเป็นหรือเคยเป็นโรคตับ ห้ามใช้แพ้กซ์โลวิดหากท่านเป็นโรคตับขั้นรุนแรง

การใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น

ห้ามให้ยาแพ้กซ์โลวิดแก่เด็กและวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะยังไม่มีการศึกษาการใช้ยาแพ้กซ์โลวิดในเด็กและวัยรุ่น

การใช้ยาอื่นร่วมกับแพ้กซ์โลวิด

มียาชนิดอื่น ๆ ที่อาจเข้ากันไม่ได้กับแพ้กซ์โลวิด โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากท่านกำลังใช้ เพิ่งใช้ หรืออาจจะใช้ยาอื่นใด ๆ ร่วมด้วย รวมถึงยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์ วิตามิน และสมุนไพรเสริมอาหารต่าง ๆ

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากท่านกำลังใช้ยากุมกำเนิดชนิดรับประทาน เนื่องจากท่านอาจจำเป็นต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยเพื่อป้องกัน ตัวอย่างเช่น การใช้ถุงยางอนามัย (โปรดดู ‘สตรีมีครรภ์ สตรีระหว่างให้นมบุตร และการเจริญพันธุ์’ ด้านล่าง)

ท่านควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ โดยเฉพาะถ้ากำลังใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้:

- ยาที่ใช้รักษาอาการของโรคต่อมลูกหมากโต เช่น แทมซูลอซิน
- ยาที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้น เช่น สารที่ได้จากเอมเฟตามีน เช่น เมทิลเฟนิเดท และเด็กซ์แอมเฟตามีน
- ยาที่ใช้รักษาอาการปวดรุนแรง เช่น มอร์ฟีน เฟนทานิล ไฮโดรโคโดน ออกซิโคโดน เมเพอริดีน เมทาโดน บูพริโนรฟีน นอร์บูพริโนรฟีน และยาอื่น ๆ ที่ออกฤทธิ์แบบมอร์ฟีน
- ยาที่ใช้รักษาความผิดปกติของหัวใจและแก่ไขการเต้นของหัวใจผิดปกติ เช่น ดิจอกซิน และไดโซไพราไมด์
- ยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง (เช่น อะพาทีนิบ อะปีมาไซคลิบ อะพาลูทาไมด์ เซริทินิบ ดาซาทีนิบ นิโลทีนิบ วินคริสทีน วินบลาสทีน เอนโคราเฟนิบ ฟอสตามาทีนิบ อิบรูทีนิบ และอีโวซิเดนิบ
- ยาที่ใช้เจือจางเลือด (ยาด้านการแข็งตัวของเลือด) เช่น วาฟาริน เอพิซาแบน ดาบิกาทราน ไรวาโรซาแบน และโวราพาสาร์
- ยาที่ใช้รักษาอาการชัก เช่น ไดवालโพรเอ็กซ์ และลาโมทรีจิ้น
- ยาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้า เช่น อะมิทริปไทลีน ฟลูอออกซีทีน อีฟิมิพรามิน นอร์ทริปไทลีน พาร์ออกซีทีน เซอร์ทราลีน และเดซิพรามิน
- ยาที่ใช้รักษาอาการแพ้ เช่น เฟกซ์โซฟีนาดีน และลอราทาดีน
- ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อรา (ยาด้านเชื้อรา) เช่น คีโตโคนาโซล อิทรานาโคนาโซล และโวริโคนาโซล
- ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย (ยาปฏิชีวนะและยาด้านไมโคแบคทีเรีย) เช่น ไรฟาบูติน อิริโทรมัยซิน อะโทวาควอน เบดาควิลีน ดีลามานิท ไรฟาเพนทีน คลาริโทรมัยซิน และซัลฟาเมทอกซาโซล/ไตรเมโพรอิม

- ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อเอชไอวี เช่น อะทาซานาเวียร์ ดารูนาเวียร์ เอฟฟาเวเร็นซ์ มาราโวโรค และซิโดวูดีน
- ยาที่ใช้รักษาความผิดปกติทางจิตและอารมณ์ เช่น โคลซาปีน ฮาโลเพริดอล ริสเพริโดน ไทโอริดาซีน ซูโวแรกซ์แซน อะริพิพราโซล เบรกซ์พิพราโซล คาร์พราซีน ไอโลเพริโดน ลูมาเทเพอร์โรน และพิมาวานเซอร์ริน
- ยาที่ใช้รักษาโรคหืดและปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับปอด เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เช่น ซัลเมเทอรอล และทีโอฟีลลีน
- ยาที่ใช้รักษาความดันเลือดสูง (ความดันโลหิตสูง) เช่น แอมโลดิพีน ดิลไทอะเซม ไนเฟดีพีน เวอราพามิล อะลิสคีเรน
- ยาที่ใช้ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดแข็งตัว เช่น ทिकाเกรลอร์ โวราพาสาร์ โคลพิโดเกรล และซิลอสทาสอล
- ยาคอร์ติโคสเตอรอยด์ที่ใช้รักษาภาวะอักเสบ เช่น เบต้าเมทาโซน บูเดโซไนด์ ซิเคลโซไนด์ เด็กซาเมทาโซน ฟลูติคาโซน เมธิลเพรดนิโซโลน โมเมทาโซน เพรดนิโซโลน และไตรแอมซิโนโลน
- ยาที่ใช้รักษาโรคซิสติก ไฟโบรซิส เช่น ไอวากาฟตอร์ อิเล็กซาคาฟตอร์/เทซาคาฟตอร์/ไอวากาฟตอร์ เทซาคาฟตอร์/ไอวากาฟตอร์
- ยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน เช่น แชนซากลลิปติน
- ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี เช่น เกลแค็บรีเวียร์/พีเบรนต์าสเวียร์
- ยาที่ใช้ลดคอเลสเตอรอลในเลือด เช่น อะทอร์วาสแตติน ฟลูวาสแตติน พรอวาสแตติน และโรซูวาสแตติน
- ยาที่ใช้กดระบบภูมิคุ้มกัน เช่น ซิโคลสปอริน ทาโครลิมัส เอเวอโรลิมัส และไซโรลิมัส
- ยาที่ใช้รักษาโรคข้ออักเสบ เช่น โทฟาซิทีนิบ และยูปาดาคิทีนิบ
- ยาที่ใช้รักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน เช่น ริเมจีแพนธ์
- ยาที่ใช้รักษาโรคกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน เช่น ดารีเฟนาซิน
- ยาที่ใช้รักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (หรือที่รู้จักในชื่อการไร้สมรรถภาพทางเพศ) เช่น ซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิล
- ยาที่ใช้รักษาความดันเลือดสูงในหลอดเลือดที่มาเลี้ยงปอด เช่น ทาดาลาฟิล โบเซนแทน และโรโอซิกวอทยาที่ใช้เป็นยาระงับประสาท ช่วยให้นอนหลับ และยานอนหลับ เช่น อัลปราโซแลม บุสไพโรน คลอนาซีแพม คลอราซีเพต ไดอะซีแพม แอสตาโซแลม ฟลูราซีแพม และโซลพิเด็ม
- ยาใดก็ตามในรายการต่อไปนี้
 - บูโพรไพออน (ยาที่ใช้สำหรับการเลิกบุหรี่)
 - ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานหรือแบบแผ่นแปะผิวหนังที่ประกอบด้วยเอทินิลเอสตราไดโอรอลที่ใช้ป้องกันการตั้งครรภ์: ควรพิจารณาใช้การคุมกำเนิดแบบปิดกั้น (barrier) หรือวิธีคุมกำเนิดที่ไม่ใช้ฮอร์โมนในระหว่าง 5 วันที่ได้รับการรักษาด้วยแพ็คเกจซิโรวิตและจนกระทั่งรอบเดือนมาครบหนึ่งรอบหลังจากหยุดการรักษาด้วยแพ็คเกจซิโรวิตมีดาโซแลมที่ให้โดยการฉีด (ยาที่ใช้ในการระงับประสาท [อยู่ในภาวะตื่น แต่รู้สึกผ่อนคลายมากหรือง่วงซึมในระหว่างขั้นตอนหรือการทดสอบทางการแพทย์] หรือการระงับความรู้สึก)
 - เลโวไทร็อกซีน (ยาที่ใช้รักษาต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกิน [ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ])

ยาหลายชนิดมีอันตรกิริยาต่อแพ็กซีโลวิด โปรดจรายการยาที่ท่านใช้เพื่อแสดงให้แพทย์หรือเภสัชกรดู โปรดอย่าเริ่มใช้ยาชนิดใหม่โดยไม่ได้แจ้งให้แพทย์ทราบ แพทย์ของท่านสามารถบอกท่านได้ว่าจะมีความปลอดภัยหรือไม่ในการใช้แพ็กซีโลวิดร่วมกับยาอื่น ๆ

สตรีมีครรภ์ สตรีระหว่างให้นมบุตร และการเจริญพันธุ์

มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะทำให้แน่ใจว่าแพ็กซีโลวิดปลอดภัยสำหรับใช้ในสตรีมีครรภ์ และยังไม่ทราบว่าแพ็กซีโลวิดจะเป็นอันตรายต่อเด็กในระหว่างที่ท่านกำลังตั้งครรภ์หรือไม่ หากท่านกำลังตั้งครรภ์ ไม่แนะนำให้ใช้แพ็กซีโลวิด ยกเว้นสภาวะทางคลินิกต้องการการรักษา

หากท่านกำลังตั้งครรภ์ คิดว่าอาจตั้งครรภ์ หรือกำลังวางแผนที่จะมีบุตร โปรดขอคำปรึกษาจากแพทย์

หากท่านตั้งครรภ์ ท่านควรงดทำกิจกรรมทางเพศหรือใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบปิดกั้นที่มีประสิทธิผลในระหว่างที่ใช้แพ็กซีโลวิดและจนกระทั่งรอบเดือนมาครบหนึ่งรอบหลังจากหยุดการรักษาด้วยแพ็กซีโลวิด

หากท่านกำลังให้นมบุตรหรือวางแผนให้นมบุตร โปรดแจ้งผู้ให้บริการทางการแพทย์ของท่านก่อนใช้นานี้ ท่านไม่ควรให้นมบุตรในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 7 วันหลังจากที่ได้รับแพ็กซีโลวิดครั้งสุดท้าย เนื่องจากยังไม่ทราบว่าแพ็กซีโลวิดผ่านเข้าสู่น้ำนมและจะส่งผ่านไปยังเด็กหรือไม่

การขับขีและการทำงานกับเครื่องจักร

ยังไม่ได้ดำเนินการทดสอบเป็นการเฉพาะสำหรับผลที่เป็นไปได้ของแพ็กซีโลวิดที่อาจมีต่อความสามารถในการขับขีหรือทำงานกับเครื่องจักร

แพ็กซีโลวิดมีส่วนประกอบของแลคโตส (น้ำตาลชนิดหนึ่ง)

หากแพทย์ของท่านแจ้งว่าท่านมีภาวะไม่ทนต่อน้ำตาลบางชนิด โปรดติดต่อแพทย์ของท่านก่อนใช้นานี้

ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณโซเดียมยานี้มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มิลลิกรัม) ต่อโดส และได้รับการพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ‘ปราศจากโซเดียม’

3. วิธีใช้แพ็กซีโลวิด

รับประทานยานี้อย่างถูกต้องตามที่แพทย์หรือเภสัชกรสั่งเสมอ สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านไม่แน่ใจ

หากท่านเป็นโรคไต โปรดขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับขนาดยาแพ็กซีโลวิดที่เหมาะสม หากท่านเป็นโรคไตที่มีความรุนแรงปานกลาง ท่านจะต้องลดขนาดแพ็กซีโลวิด หากท่านเป็นโรคไตขั้นรุนแรง ท่านต้องไม่ใช้แพ็กซีโลวิด

แพ็กซีโลวิดประกอบไปด้วยยา 2 ชนิด: เนอร์มาเทรลเวียร์ และริโทนาเวียร์ ขนาดยาที่แนะนำคือ เนอร์มาเทรลเวียร์ จำนวน 2 เม็ดร่วมกับริโทนาเวียร์ 1 เม็ด โดยรับประทานวันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนกลางคืน) แผงพอยล์บลิสเตอร์สำหรับการรักษาแต่ละวันถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนที่มีสีแตกต่างกัน เพื่อระบุว่าต้องรับประทาน

ยาเม็ดใดในแต่ละเวลาของวัน – ด้านหนึ่งสำหรับขนาดยาในตอนเช้าและอีกด้านหนึ่งสำหรับขนาดยาในตอนเย็น

ระยะเวลาการรักษาคือ 5 วัน สำหรับแต่ละโดส ให้รับประทานยาทั้งหมด 3 เม็ดพร้อมกัน

ควรกลืนยาทั้งเม็ด ห้ามเคี้ยว หัก หรือบดเม็ดยา แพ็กซีโลวิดสามารถรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้

การใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น

แพ็กซีโลวิดไม่มีข้อบ่งใช้ในการรักษาเด็กและวัยรุ่น (อายุต่ำกว่า 18 ปี)

หากท่านรับประทานแพ็กซีโลวิดมากกว่าที่ควร

หากท่านรับประทานยาแพ็กซีโลวิดเกินขนาด โปรดโทรศัพท์ไปยังผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดในทันที

หากท่านลืมรับประทานยาแพ็กซีโลวิด

หากท่านลืมรับประทานยาแพ็กซีโลวิดหนึ่งโดส ให้รับประทานยาทันทีที่ท่านนึกได้ หากเลยเวลาไปแล้วมากกว่า 8 ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่ท่านลืมรับประทานยา โปรดอย่ารับประทานยาครั้งที่ลืมและให้รับประทานยาครั้งถัดไปที่เวลาปกติ

อย่ารับประทานยาโดยเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่าเพื่อทดแทนยาครั้งที่ลืมไป

หากท่านรู้สึกดีขึ้น

แม้ว่าท่านจะรู้สึกว่ามีอาการดีขึ้น โปรดอย่าหยุดรับประทานยาแพ็กซีโลวิดโดยไม่ได้ขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการทางการแพทย์

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ยานี้เพิ่มเติม โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทุกชนิด ยานี้สามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่าง ๆ ได้ แต่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกราย มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้ยาแพ็กซีโลวิด ดังนั้นจึงอาจเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงและไม่คาดคิดได้

พบบ่อย: อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยไม่เกิน 1 ใน 10 ราย

- ท้องเสีย
- คลื่นไส้
- การรับรสชาติเปลี่ยนไป (เช่น รู้สึกเหมือนมีโลหะในปาก รู้สึกมีรสขมในปาก)
- ปวดศีรษะ

พบไม่บ่อย: อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยไม่เกิน 1 ใน 100 ราย

- ปฏิกิริยาการแพ้ (เช่น ลมพิษ กลืนหรือหายใจลำบาก บวมในปาก ริมฝีปาก หรือใบหน้า อี๊ดอัด/แน่นที่คอ เสียงแหบ หรือผื่นผิวหนัง)
- อาเจียน
- ปวดท้อง
- ความดันเลือดสูง

พบน้อย: อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยไม่เกิน 1 ใน 1,000 ราย

- ปฏิกิริยาการแพ้รุนแรง รู้จักในชื่อ “anaphylaxis” (เช่น บวมที่ลิ้น ปาก และใบหน้า กลืนหรือหายใจลำบาก อี๊ดอัด/แน่นที่คอ หรือเสียงแหบ)
- ปฏิกิริยาผิวหนังร้ายแรง รู้จักในชื่อ “toxic epidermal necrolysis” และ “Stevens Johnson syndrome” (เช่น ผื่นแดงและปวด ผื่นพุพองและหลุดลอก พุพองหรือเจ็บที่ปากหรือริมฝีปาก)
- ความรู้สึกไม่สบาย

การรายงานผลข้างเคียง

หากท่านประสบผลข้างเคียงใด ๆ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นใด ๆ ที่ไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารกำกับยาฉบับนี้ โดยการรายงานผลข้างเคียง ท่านสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้

5. ควรเก็บแพ็คเกจยาดังต่อไปนี้

เก็บยานี้ให้พ้นจากสายตาและมือเด็ก

ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายุที่ได้ระบุไว้บนกล่องหรือบนแผงบลิสเตอร์ ซึ่งอยู่หลังคำว่า “EXP” วันหมดอายุหมายถึง วันสุดท้ายของเดือนนั้น

เก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส

ห้ามแช่เย็นหรือแช่แข็ง

ห้ามทิ้งยาใด ๆ ลงไปในท่อน้ำทิ้งหรือในถังขยะในบ้านเรือน โปรดสอบถามเภสัชกรของท่านว่าจะทิ้งยาที่ท่านไม่ใช้แล้วอย่างไร มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสภาพแวดล้อม

6. ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์และข้อมูลอื่น ๆ

แพ็คเกจยาดังต่อไปนี้มีส่วนประกอบใดบ้าง

- ตัวยาคือ เฟอร์มาเทรลเวียร์ และริโทนาเวียร์

- ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม เนอร์มาเทรลเวียร์ สีชมพูแต่ละเม็ดประกอบไปด้วย เนอร์มาเทรลเวียร์ ขนาด 150 มิลลิกรัม
- ยาเม็ดเคลือบฟิล์มริโทนาเวียร์ สีขาวถึงสีขาวออกเหลืองอ่อนแต่ละเม็ดประกอบไปด้วยริโทนาเวียร์ ขนาด 100 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ใน เนอร์มาเทรลเวียร์ คือ ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส แลคโตสโมโนไฮเดรต (ดูหัวข้อ 2 ‘แพ็คเกจโลวิตมีส่วนประกอบของแลคโตส’) คออสคาร์เมลลอยด์โซเดียม คอลลอยด์ซิลิโคนไดออกไซด์ และโซเดียมสเตียริลฟูมาเรต สารเคลือบฟิล์มมีส่วนประกอบของไฮโปรมะลอส (E464) โทเทเนียมไดออกไซด์ (E171) มาโครกอล (E1521) และไอรอนออกไซด์ สีแดง (E172)
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ในริโทนาเวียร์คือ โคโพลีโตน ซอร์บิแทนลอเรท ซิลิกา คอลลอยด์แอลไฮดรรัส (E551) แคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตแอลไฮดรรัส และโซเดียมสเตียริลฟูมาเรต สารเคลือบฟิล์มมีส่วนประกอบของไฮโปรมะลอส (E464) โทเทเนียมไดออกไซด์ (E171) มาโครกอล (E1521) ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส (E463) ทาลก์ (E553b) ซิลิกา คอลลอยด์แอลไฮดรรัส (E551) และพอลิซอร์เบต 80 (E433)

แพ็คเกจโลวิตมีลักษณะเป็นอย่างไรและส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์มีอะไรบ้าง

ยาเม็ดแพ็คเกจโลวิตบรรจุอยู่ในแผงบลิสเตอร์ที่มียาสำหรับรับประทานแต่ละวัน จำนวน 5 แผง โดยมียาเม็ดทั้งหมด 30 เม็ดบรรจุอยู่ในกล่อง

แผงบลิสเตอร์แต่ละแผงที่มียาสำหรับรับประทานแต่ละวันมียา เนอร์มาเทรลเวียร์ จำนวน 4 เม็ด (เม็ดละ 150 มิลลิกรัม) และยา ริโทนาเวียร์ จำนวน 2 เม็ด (เม็ดละ 100 มิลลิกรัม) และได้มีเครื่องหมายบ่งชี้ไว้ว่ายาเม็ดใดที่ต้องรับประทานในตอนเช้าและในตอนเย็น

ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม เนอร์มาเทรลเวียร์ ขนาด 150 มิลลิกรัมมีลักษณะเป็นรูปรี สีชมพู ด้านหนึ่งสลักตัวอักษร ‘PFE’ อีกด้านหนึ่งสลักตัวอักษร ‘3CL’

ยาเม็ดเคลือบฟิล์มริโทนาเวียร์ ขนาด 100 มิลลิกรัมมีลักษณะเป็นรูปรี สีขาวถึงสีขาวออกเหลืองอ่อน ด้านหนึ่งสลักตัวอักษร ‘H’ อีกด้านหนึ่งสลักตัวอักษร ‘R9’

ชื่อผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่มีการแก้ไขปรับปรุงเอกสาร

8 สิงหาคม 2567

PIL Revision No.: 2.2

PIL Date: August 08, 2024

Country: Thailand



โปรดสแกนรหัสคิวอาร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม