

## ดาโคมิทินิบ

ความแรง 15, 30 และ 45 มิลลิกรัม  
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม  
ชื่อการค้า VIZIMPRO (วิ-ซิม-โปร)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ดาโคมิทินิบ (dacomitinib)

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งปอดที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - มีความผิดปกติของปอด หรือการหายใจ เช่น หายใจลำบาก หายใจไม่อิ่ม ไอแบบมีเสมหะ หรือไม่มีเสมหะ มีไข้
  - แพ้น้ำตาลนม (แลคโตส) เนื่องจากตัวยามีส่วนผสมของน้ำตาลแลคโตส
- เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- กำลังตั้งท้องหรือวางแผนที่จะมีลูก
- กำลังให้นมลูก
- เป็นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่ได้คุมกำเนิด
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยารักษาโรคหัวใจ เต็นต์ฉีดงูเห่า ยารักษาโรคจิตหรือจิตเภท ยาลดกรด ในกระเพาะอาหาร

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

หากไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่

คำเตือน: ยานี้ อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้  
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาเวลาเดียวกันทุกวัน
- กินยาพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยาน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมกินยามากกว่า 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ผู้หญิงต้องคุมกำเนิดในระหว่างได้รับยา และคุมต่อไปหลังหยุดยาอีกอย่างน้อย 17 วัน
- ผู้หญิงที่กำลังให้นมลูก ต้องงดให้นมลูกในขณะที่ใช้ยานี้ และต่อเนื่องอีก 17 วันหลังหยุดยา
- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ อาจทำให้อ่อนเพลีย และระคายเคืองตา
- เมื่อพบอาการท้องเสีย ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีตั้งแต่วางแรกที่เกิดอาการ และดื่มน้ำให้เพียงพอ

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก หรือมีฝ้าตามผิวหนัง
- หายใจลำบาก หายใจไม่ออก อาจมีอาการไอหรือมีไข้ร่วมด้วย
- ท้องเสียรุนแรง ปากแห้ง คอแห้ง
- ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีอ่อน

“ให้หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที”

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ผมร่วง ผิวแห้ง คันผิวน้ำ ผิวลอก
- ไม่ย่อยอาหาร น้ำหนักลด
- ช่องปากอักเสบ
- ตาแห้ง แดง หรือคันตา
- คลื่นไส้ อาเจียน

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา  
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา เป็นเม็ดสีฟ้า รูปร่างกลมมนทั้งสองด้าน
- ตัวยาสําคัญ ดาโคมิทินิบ 15, 30 และ 45 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ แลคโตสโมโนไฮเดรต (lactose monohydrate), ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส (microcrystalline cellulose), โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต (sodium starch glycolate), แมกนีเซียมสเตียเรต (magnesium stearate)

ผู้ผลิต Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH ประเทศเยอรมนี

ผู้รับอนุญาต บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

ผู้จำหน่ายในประเทศไทย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ เมษายน 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.

- <https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <https://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร