



เอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วย

ยาเม็ดซิโทรแมกซ์™ (ZITHROMAX™) 250 มิลลิกรัม อะซิโทรมัซิน (Azithromycin)

โปรดอ่านเอกสารนี้ให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนเริ่มรับประทานยา

- เอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยนี้รวบรวมข้อมูลสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยานี้ ไม่ได้มีข้อมูลยาครบถ้วนหรือทดแทนการดูแลโดยแพทย์หรือเภสัชกร ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม หรือเกิดอาการข้างเคียงใด ๆ รวมถึงอาการที่ไม่เคยปรากฏในเอกสารนี้ หรือมีอาการรุนแรงหรือร้ายแรงขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ให้ใช้สำหรับคุณเท่านั้น ห้ามให้ยานี้แก่ผู้อื่นแม้ว่าจะมีอาการเหมือนกันเพราะอาจเป็นอันตรายได้

This leaflet answers some common questions about this medicine. It does not contain complete drug information and cannot substitute for professional care. If you have any questions or suspect that you have adverse drug reactions, please contact your pharmacist or physician.

This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others because it may harm them.

1. ยาซิโทรแมกซ์คือยาอะไร และใช้รักษาในกรณีใด

ยาซิโทรแมกซ์มีตัวยาสำคัญคือ อะซิโทรมัซิน 250 มิลลิกรัม ยาอะซิโทรมัซินเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมโครไลด์ (macrolides) มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อจุลินทรีย์อื่น ๆ ที่ไวต่อยานี้

โดยทั่วไปแพทย์จะสั่งใช้ยาซิโทรแมกซ์เพื่อรักษาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ทอนซิลอักเสบ คอหอยอักเสบ ไช้น้ำอักเสบและการติดเชื้อในหูชั้นกลางเฉียบพลัน ตลอดจน

การติดเชื้อทางทันตกรรมและช่องปาก การติดเชื้อบริเวณผิวหนัง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อคลาเมียเดียหรือเชื้อ Neisseria หรือ รักษาแผลริมอ่อน

2. ก่อนรับประทานยาซิโรแมกซ์

ห้ามรับประทานยาซิโรแมกซ์ ในกรณีต่อไปนี้

แพ้ยาอะซิโธรมัยซิน ยาปฏิชีวนะอื่นในกลุ่ม macrolide หรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในเม็ดยา ได้แก่ ปริเจลาติไนท์ดิสตาร์ช แคลเซียมฟอสเฟตไดเบสสิคแอนไฮดรัส คอสคาร์เมลโลสโซเดียม แมกนีเซียมสเตียเรต โซเดียมลอริลซัลเฟต ฟิล์มเคลือบเม็ดยา ประกอบด้วย ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส ไตรอะซีติน และไทเทเนียม ไดออกไซด์ (E171)

ผู้ที่ควรระมัดระวังหากต้องรับประทานยาซิโรแมกซ์

- รับประทานยากกลุ่ม ergot
- เป็นโรคตับ
- กำลังมีครรภ์หรือคาดว่าจะมีครรภ์ หรือวางแผนจะมีครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- ผู้ป่วยที่ไตทำงานบกพร่องอย่างรุนแรง
- ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะการเต้นของหัวใจช่วง QT ที่ยาวขึ้น (เช่น ได้รับการรักษาด้วยยาอื่นที่ทำให้เกิดช่วง QT ที่ยาวขึ้น ได้แก่ ยารักษาโรคจิตเภท ยาต้านอาการซึมเศร้า เป็นต้น) ผู้ป่วยที่หัวใจเต้นช้าอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิก หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะหรือหัวใจล้มเหลว
- ผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

การรับประทานยาซิโรแมกซ์ร่วมกับยาอื่น

ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งหากคุณเพิ่งใช้หรือกำลังใช้ยาอื่น ๆ ร่วมด้วย แม้จะไม่ใช่ยาที่ได้สั่งโดยแพทย์ก็ตาม ยาที่อาจถูกรบกวนจากการใช้ยาซิโรแมกซ์ หรืออาจมีผลต่อการทำงานของยาซิโรแมกซ์ ได้แก่ digoxin (ยารักษาโรคหัวใจ) colchicine (ยารักษาโรคเกาต์) ยา ergot (ใช้รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน) ยาต้านการจับตัวเป็นลิ่มของเลือดประเภท Coumarin ชนิดรับประทาน (เช่น วาร์ฟาริน) ยา cyclosporine (ใช้กดภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและรักษาการต้านของอวัยวะหรือไขกระดูกที่ได้รับการปลูกถ่าย) ยาลดกรด ยารักษาการติดเชื้อบางตัว เช่น ไรฟาบูติน (rifabutin)

หญิงมีครรภ์

ไม่แนะนำให้รับประทานยาซิโทรแมกซ์ในระหว่างมีครรภ์ เว้นเสียแต่แพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่มียาอื่นให้
เลือกใช้แทน ในหญิงที่มีโอกาสมีครรภ์หรือหากคุณวางแผนที่จะมีครรภ์ในขณะที่รับประทานยาซิโทรแมกซ์
ควรปรึกษาแพทย์

หญิงให้นมบุตร

ไม่แนะนำให้รับประทานยาซิโทรแมกซ์ในระหว่างให้นมบุตร เว้นเสียแต่แพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่มียาอื่นให้
เลือกใช้แทน

ความสามารถในการขับขีเยนพาหะและควบคุมเครื่องจักรกล

ยังไม่มีข้อมูลของยาซิโทรแมกซ์เกี่ยวกับผลต่อความสามารถในการขับขีเยนพาหะหรือควบคุม
เครื่องจักรกล ดังนั้นหากมีอาการมึนงง หรือเวียนศีรษะ ห้ามขับรถหรือใช้เครื่องจักรกล

3. การรับประทานยาซิโทรแมกซ์

ขนาดรับประทานของยาซิโทรแมกซ์ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค แพทย์จะเป็นผู้สั่งยาที่เหมาะสม
กับอาการของคุณ จึงควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งเสมอ ควรรับประทานยาให้ครบตามที่แพทย์สั่ง
ถึงแม้ว่าคุณจะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม

ขนาดรับประทานโดยทั่วไปของยาซิโทรแมกซ์คือ 500 มิลลิกรัม (เท่ากับ 2 เม็ด) วันละครั้งเดียว เป็นเวลา
3 วันหรือตามแพทย์สั่ง

ขนาดรับประทานสำหรับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากเชื้อหนองในเทียม หรือแผลริม
อ่อน คือ 1 กรัม (เท่ากับ 4 เม็ด) เพียงครั้งเดียว ขนาดรับประทานสำหรับการติดเชื้อ *Neisseria*
gonorrhoeae ที่ไวต่อยา คือ 1 กรัม หรือ 2 กรัม ร่วมกับ ceftiraxone 250 หรือ 500 มิลลิกรัม สำหรับผู้ที่
แพ้ยาเพนิซิลลินและ/หรือยาเซฟาโลสปอรินควรแจ้งให้แพทย์ทราบ

หากคุณจำเป็นต้องรับประทานยาลดกรดด้วย ควรรับประทานยาซิโทรแมกซ์ ก่อนรับประทานยาลดกรด 1
ชั่วโมง หรือหลังรับประทานยาลดกรดแล้ว 2 ชั่วโมง

ขนาดยารวมทั้งหมดสำหรับเด็กไม่ควรเกิน 1500 มิลลิกรัม (เท่ากับ 6 เม็ด)

หากคุณรับประทานยาซิโทรแมกซ์มากกว่าที่แพทย์สั่ง

หากคุณรับประทานยาซิโทรแมกซ์มากกว่าที่แพทย์สั่ง (หรือมีผู้อื่นรับประทานยาของคุณ) ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยทันทีและนำยาที่เหลือหรือกล่องยาไปด้วยแม้ว่าจะมียาเหลืออยู่หรือไม่ก็ตาม อย่ารับประทานยาต่อจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์

หากคุณลืมรับประทานยาซิโทรแมกซ์

หากคุณลืมรับประทานยาซิโทรแมกซ์ให้รับประทานยานี้ทันทีที่นึกได้ หากนึกได้ใกล้ระยะเวลารับประทานยาในครั้งถัดไป ให้รับประทานยาในครั้งถัดไปให้ตรงเวลา ห้ามรับประทานยาเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อทดแทนการลืมรับประทานยาครั้งที่ผ่านมา และไม่ควรรับประทานยาเกินกว่าวันละ 1 ครั้ง

การหยุดยาซิโทรแมกซ์

หากคุณหยุดยาซิโทรแมกซ์ก่อนที่แพทย์กำหนด เชื้ออาจกำเริบขึ้นมาใหม่ได้ ไม่ต้องกังวลหากคุณรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งแล้วยังไม่รู้สึกดีขึ้น ยายังคงออกฤทธิ์ฆ่าเชื้ออยู่ถึงแม้คุณจะหยุดรับประทานยาแล้วก็ตาม หากคุณยังไม่รู้สึกดีขึ้นใน 2-3 วันหลังจากสิ้นสุดระยะการรักษา ควรกลับไปพบแพทย์

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

เช่นเดียวกับยาอื่น ๆ ยาซิโทรแมกซ์อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อไปนี้ในบางคน

อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อย ได้แก่ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อูจาระเหลว ท้องเสีย ท้องอืด

หากมีอาการต่อไปนี้หลังจากรับประทานยา ถึงแม้ว่าอาการอาจเกิดขึ้นน้อยมากแต่อาจมีความรุนแรง ให้หยุดรับประทานยาซิโทรแมกซ์และไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด:

- หอบหืด มีเสียงหายใจหวีด หายใจถี่ หายใจลำบาก
- หัวใจเต้นเร็วหรือผิดจังหวะ
- ผื่นแดงอักเสบที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ที่ริมฝีปาก ตา ปาก จมูก หรืออวัยวะเพศ
- มีผื่นลอกรุนแรง มีเลือดออก

5. คำแนะนำในการเก็บยาซิโทรแมกซ์

ควรเก็บยาไว้ในแผงจนกว่าจะถึงเวลารับประทานยา

ควรเก็บยาไว้ในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิไม่เกินที่ระบุไว้บนภาชนะบรรจุ และเก็บให้พ้นมือเด็ก

ห้ามใช้ยาหลังวันสิ้นอายุของยาที่แสดงไว้บนฉลาก หากไม่ระบุเป็นอย่างอื่น วันสิ้นอายุของยาหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนที่แสดงบนฉลาก

6. ชื่อผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
2. ผู้ที่เป็นโรคตับระยะมึนงงการใช้ยานี้
3. ระยะมึนงงการใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาไมเกรนที่มีเออร์โกทามีนเป็นส่วนประกอบเพราะอาจทำให้เกิดพิษหรือเสียชีวิตได้
4. สตรีมีครรภ์ระยะมึนงงการใช้ยานี้
5. หากใช้ยานี้แล้วมีผื่นแดง ตุ่มหนอง ตุ่มน้ำพอง ต่อม้ำเหลืองโต หรือมีไข้สูงที่ไม่ใช่อาการที่มีอยู่เดิม ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทันทีเพราะอาจเป็นผื่นแพ้ยาที่รุนแรงได้ (Severe cutaneous adverse drug reactions; SCARs)
6. ยานี้อาจทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT ยาวขึ้นได้ จึงควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าว เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติ เป็นต้น
7. ระยะมึนงงการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่เปลี่ยนแปลงผ่าน CYP3A4 เช่น warfarin ยารักษาโรคหัวใจ เช่น digoxin, HIV protease inhibitors เช่น ritonavir เนื่องจากระดับยาเหล่านี้ในเลือดอาจสูงขึ้นจนเกิดอันตรายได้ และยาลดระดับไขมันในเลือด เช่น simvastatin, atorvastatin เนื่องจากพบความเสี่ยงของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อผิดปกติ (myopathy) หรือภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย (rhabdomyolysis) มากขึ้น

ข้อมูลในเอกสารกำกับยานี้เป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับยาซิโทรแมกซ์ชนิดเม็ดเท่านั้น