



เอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วย

ยาเม็ดเคลือบฟิล์มเซลแจนซ์™ (XELJANZ™) 5 มิลลิกรัม โทฟาซิทีนิบ (tofacitinib)

คำเตือนการติดเชื้อร้ายแรงและการเกิดมะเร็ง โปรดดูคำเตือนแบบละเอียดในเอกสารกำกับยา

- พบการติดเชื้อร้ายแรงในผู้ป่วยที่ได้รับยาเซลแจนซ์ที่ทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลหรือถึงแก่ชีวิตจากวัณโรค การติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราแบบลุกลาม ไวรัสและเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ
- ถ้าการติดเชื้อร้ายแรงเป็นมากขึ้น ต้องหยุดให้ยาเซลแจนซ์จนกว่าจะควบคุมการติดเชื้อได้
- ก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาเซลแจนซ์ ต้องทดสอบวัณโรคแบบแฝงก่อน ถ้าผลการทดสอบเป็นบวกต้องให้การรักษาวัณโรคก่อนเริ่มใช้ยาเซลแจนซ์
- ระหว่างการรักษาต้องติดตามการเกิดวัณโรคในผู้ป่วยทุกราย แม้ผลการทดสอบวัณโรคแบบแฝงก่อนรักษาให้ผลลบ
- สังเกตพบมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งอื่นในผู้ป่วยที่ได้รับยาเซลแจนซ์ Epstein Barr Virus มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติของการแบ่งตัวของลิมโฟไซต์หลังปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งสังเกตพบในผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายไตที่ได้รับยาเซลแจนซ์ร่วมกับยากดระบบภูมิคุ้มกัน

1. ชื่อยา

เซลแจนซ์™ (XELJANZ™)

2. ลักษณะยา

ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม

3. ส่วนประกอบของยา

ตัวยาสําคัญ คือ โทฟาซิทีนิบ ซิเตรต (tofacitinib citrate)

4. ความแรงของยา

5 มก.

5. ยาที่ใช้เพื่ออะไร

เซลแจนซ์ มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในผู้ใหญ่ที่มีความรุนแรงโรคในระดับปานกลางถึงรุนแรง ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยเมโทเทริกเซท หรือไม่ทนต่อการใช้เมโทเทริกเซท

6. คุณควรใช้ยาปริมาณเท่าไรและบ่อยเพียงใด

แพทย์ที่จ่ายยานี้ให้คุณคือผู้ที่ทราบวิธีรักษาภาวะข้ออักเสบของคุณ

โปรดใช้เซลแจนซ์ ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด แพทย์จะพิจารณาขนาดยาที่เหมาะสมกับคุณ คุณควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อความแน่ใจ

ขนาดยาที่แนะนำคือ 5 มก. วันละสองครั้ง แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยาของคุณตามการตอบสนองทางคลินิก

เซลแจนซ์เป็นยาเม็ดสำหรับให้ทางปากเท่านั้น โดยจะรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา โปรดรับประทาน เซลแจนซ์ ในเวลาเดียวกันทุกวันโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หากคุณรับประทาน เซลแจนซ์ เกินขนาดที่ควร

หากคุณรับประทานยาเกินขนาดที่ควร โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณทันที

หากคุณลืมรับประทาน เซลแจนซ์

ห้ามรับประทานยาเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อชดเชยยาที่ลืมรับประทานไป ให้รับประทานยาเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ และรับประทานต่อเนื่องเหมือนเดิม

หากคุณหยุดรับประทาน เซลแจนซ์

คุณไม่ควรหยุดรับประทาน เซลแจนซ์ โดยไม่ปรึกษาแพทย์ของคุณ

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

7. เมื่อไรคุณไม่ควรใช้ยานี้

ห้ามใช้ เซลแจนซ์ ในกรณีต่อไปนี้

- หากคุณมีประวัติการแพ้ โทฟาซิทีนิบ หรือส่วนผสมอื่นๆ ของยานี้
- หากคุณมีภาวะตับบกพร่องอย่างรุนแรง
- หากคุณกำลังมีการติดเชื้ออย่างร้ายแรง รวมถึงการติดเชื้อเฉพาะที่
- หากคุณมีความผิดปกติของผลทางห้องปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับขนาดยา รวมถึงภาวะเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ต่ำ (ต่ำกว่า 500 เซลล์/มม.³) ภาวะนิวโทรฟิลต่ำ (ต่ำกว่า 1000 เซลล์/มม.³) และภาวะโลหิตจาง (ต่ำกว่า 9 ก./เดซิลิตร)
- หากคุณกำลังได้รับยา DMARD ที่เป็นชีววัตถุอื่นๆ เช่น abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab, rituximab, tocilizumab หรือร่วมกับยากดระบบภูมิคุ้มกันที่ประสิทธิภาพสูง เช่น azathioprine และ cyclosporine

สตรีมีครรภ์

ไม่ควรใช้ เซลแจนซ์ ขณะตั้งครรภ์ ยกเว้นมีความจำเป็นอย่างชัดเจน

สตรีที่มีโอกาสในการตั้งครรภ์ควรใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพระหว่างรักษาด้วยเซลแจนซ์ และใช้ต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 28 วันหลังจากหยุดการรักษา คุณควรขอคำแนะนำเกี่ยวกับการคุมกำเนิดจากแพทย์

แจ้งแพทย์ของคุณ หากคุณตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์

สตรีระหว่างให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลว่าโทฟาซิทีนิบ หลังออกมาพร้อมกับน้ำนมมนุษย์หรือไม่ ไม่แนะนำให้สตรีเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมตนเอง

โปรดขอคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ยาใดๆ

8. อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

เซลแจนซ์ สามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียงเช่นเดียวกับยาทุกชนิด แม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนก็ตาม

อาการข้างเคียงจากการศึกษาทางคลินิก

อาการข้างเคียงที่พบบ่อยและพบบ่อย

คอหอยส่วนจมูกอักเสบ ปวดบวม งูสวัด หลอดลมอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ ไช้หัดใหญ่ ไช้หัดอักเสบ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ คอหอยอักเสบ เอนไซม์ตับเพิ่มขึ้น เอนไซม์ครีเอตินฟอสโฟไคนเนสเพิ่มขึ้น low density lipoprotein เพิ่มขึ้น โคลเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น ปวดท้อง อาเจียน ภาวะอหิวาต์ อักเสบ ท้องร่วง คลื่นไส้ อาหารไม่ย่อย ภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ เจ็บปวดที่ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก อาการปวดข้อ ภาวะลิโวโคไซต์ต่ำ ภาวะโลหิตจาง ไข้ อ่อนล้า การบวม น้ำที่แขนหรือขา ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ความดันโลหิตสูง อาการหายใจลำบาก อาการไอ ผื่น ข้อต่อแพลง สิว*

*อาการข้างเคียงที่พบบ่อยหลังวางจำหน่าย

อาการข้างเคียงที่พบน้อยแต่สำคัญ

วัณโรคที่ระบบประสาทส่วนกลาง สมองอักเสบ necrotizing fasciitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตค็อกคัส วัณโรคแบบแพร่กระจาย ติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ ปวดบวมจากเชื้อ *Pneumocystis jirovecii* ภาวะเลือดมีแบคทีเรียสเตรปโทค็อกคัส วัณโรค ข้ออักเสบจากแบคทีเรีย atypical mycobacterial infection การติดเชื้อกลุ่ม *Mycobacterium avium complex* การติดเชื้อ
ไซโตเมกกะโลไวรัส ภาวะเลือดมีแบคทีเรีย ภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดดำ สายตาเปลี่ยน
ฉับพลัน (จากภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดดำในจอตา)

อาการข้างเคียงเหล่านี้ไม่ใช่อาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ เซลแจนซ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

แจ้งแพทย์ของคุณ หากเกิดอาการข้างเคียงใดๆ ที่ทำให้คุณเป็นกังวลหรือที่ไม่หายไป

9. ขณะใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือรับประทานอาหารประเภทใด

คุณสามารถรับประทาน เซลแจนซ์ พร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างก็ได้

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ หากคุณกำลังใช้ เคยใช้เมื่อไม่นานมานี้ หรืออาจจะใช้ยาอื่น ๆ ร่วมด้วย รวมถึงยาที่ซื้อโดยไม่ต้องอาศัยใบสั่งยา เช่น วิตามินและอาหารเสริมสมุนไพร

ยาบางชนิดไม่ควรใช้ร่วมกับเซลเจนซ์ หากใช้ร่วมกับเซลเจนซ์ ยาเหล่านี้อาจมีผลให้ระดับของเซลเจนซ์ในร่างกายของคุณไม่เหมาะสม และอาจจำเป็นต้องมีการปรับขนาดยาเซลเจนซ์ คุณควรแจ้งแพทย์ของคุณ หากคุณกำลังใช้ยา (โดยการรับประทาน) ที่มีตัวยาออกฤทธิ์ใดๆ ต่อไปนี้

- ยาปฏิชีวนะ เช่น erythromycin, clarithromycin และ rifampin ที่ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย
- fluconazole, ketoconazole, clotrimazole, itraconazole และ voriconazole ที่ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อรา
- ยารักษาจังหวะการเต้นของหัวใจ อาการปวดแสบหัวใจ และความดันโลหิต เช่น amiodarone, diltiazem และ verapamil

ไม่ควรใช้ เซลเจนซ์ ร่วมกับสารชีวบำบัดอื่นๆ ที่ใช้ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หรือร่วมกับยาที่กดระบบภูมิคุ้มกันของคุณ เช่น azathioprine, cyclosporine และ tacrolimus การใช้เซลเจนซ์ร่วมกับยาเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อของคุณ

10. คุณควรทำอย่างไรถ้าคุณลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่คุณลืมรับประทานยานี้ ห้ามรับประทานเป็นสองเท่าเพื่อชดเชยยาเม็ดที่ลืมรับประทานไป โปรดรับประทานยาเม็ดต่อไปตามปกติ และรับประทานต่อเนื่องตามเดิม

11. คุณควรเก็บรักษายาอย่างไร

เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ห้ามใช้ยาเซลเจนซ์ หลังวันหมดอายุซึ่งแสดงอยู่บนฉลาก

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส คุณสามารถเก็บยาที่เหลือไว้ในภาชนะบรรจุยาเดิมได้

12. ลักษณะและอาการเมื่อได้รับยาเกินขนาด

ไม่มีประสบการณ์การได้รับเซลเจนซ์เกินขนาด อาการที่อาจเกิดขึ้นอาจคล้ายคลึงกับอาการข้างเคียงจากยา

13. คุณควรทำอย่างไรถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำ

หากคุณใช้ยาเกินขนาดที่คุณควรใช้ หรือมีบุคคลอื่นใช้ยาของคุณโดยไม่ตั้งใจ คุณควรแจ้งแพทย์ทันทีหรือติดต่อเราทันทีเพื่อขอคำแนะนำ โปรดนำยามาพร้อมกับหีบห่อบรรจุยา

14. ผู้รับอนุญาตนำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

15. ข้อควรปฏิบัติในระหว่างใช้ยา

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนใช้เซลเจนซ์

- หากคุณคิดว่าคุณมีการติดเชื้อหรือมีอาการจากการติดเชื้อ เช่น มีไข้ เหงื่อออก หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ ไอ หายใจขัด เริ่มมีเสมหะหรือลักษณะเสมหะเปลี่ยนไป น้ำหนักลด ผิวน้ำเหลืองแดง หรือปวด หรือเจ็บตามร่างกายของคุณ ท้องเสียหรือปวดท้อง แสบร้อนเมื่อถ่ายปัสสาวะ หรือถ่ายปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ รู้สึกเพลียมาก
- หากคุณกำลังได้รับการรักษาอาการติดเชื้อ
- หากคุณติดเชื้อบ่อย หรือติดเชื้อเดิมซ้ำๆ
- หากคุณมีภาวะใดๆ ที่เพิ่มโอกาสในการติดเชื้อของคุณ (เช่น เบาหวาน ติดเชื้อเอชไอวี/เป็นโรคเอดส์ ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ โรคปอดเรื้อรัง หรือมีจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ต่ำ) เนื่องจากผู้ที่มีภาวะเหล่านี้มีโอกาสการติดเชื้อสูงกว่า
- หากคุณติดเชื้อหรือเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไวรัสตับอักเสบนิดซี (ไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อตับ) อยู่แล้ว ไวรัสดังกล่าวอาจก่อการขณะที่คุณกำลังใช้ เซลเจนซ์ ซึ่งเกิดขึ้นกับยาอื่นๆ ที่ใช้ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA) เช่นกัน แพทย์ของคุณอาจทำการตรวจเลือดเพื่อหาโรคตับอักเสบบีก่อนเริ่มการรักษาด้วย เซลเจนซ์และระหว่างที่คุณใช้ เซลเจนซ์
- หากคุณเป็นวัณโรคหรือได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็วัณโรค แพทย์ของคุณจะตรวจคุณเพื่อหาวัณโรคก่อนเริ่มให้ เซลเจนซ์
- หากคุณมีการอักเสบของลำไส้ใหญ่ (ถุงลำไส้อักเสบ; diverticulitis) หรือแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้อยู่
- หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับ รวมถึงโรคตับแข็ง คุณไม่ควรใช้ เซลเจนซ์ หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับอย่างรุนแรง
- หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไตอย่างรุนแรง
- หากคุณคิดจะฉีดวัคซีน โปรดแจ้งแพทย์ของคุณก่อน คุณไม่ควรฉีดวัคซีนบางชนิดระหว่างใช้ เซลเจนซ์ คุณควรฉีดวัคซีนตามแนวทางการให้วัคซีนในปัจจุบันให้ครบก่อนเริ่มการรักษาด้วย เซลเจนซ์

- หากเคยเป็นมะเร็งชนิดใดมาก่อน เซลเจนซ์ อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งบางชนิด เช่นเดียวกับยาอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน มีรายงานมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งอื่นๆ ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเซลเจนซ์

การตรวจติดตามเพิ่มเติม

แพทย์ของคุณควรทำการตรวจเลือดก่อนที่คุณจะเริ่มการใช้ เซลเจนซ์และหลังการรักษา 4 ถึง 8 สัปดาห์ จากนั้นจึงตรวจเลือดทุกๆ 3 เดือน เพื่อประเมินว่าคุณมีจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว (นิวโทรฟิลหรือลิมโฟไซต์) ต่ำ หรือจำนวนเม็ดเลือดแดงต่ำ (ภาวะโลหิตจาง) หรือไม่

คุณไม่ควรได้รับเซลเจนซ์ หากจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว (นิวโทรฟิลหรือลิมโฟไซต์) หรือจำนวนเม็ดเลือดแดงของคุณต่ำเกินไป แพทย์ของคุณอาจหยุดการรักษาด้วย เซลเจนซ์ เป็นระยะเวลาหนึ่งหรือปรับขนาดยาของคุณตามจำเป็น หากพบการเปลี่ยนแปลงในผลการตรวจเลือดเหล่านี้

แพทย์ของคุณยังอาจทำการตรวจอื่นๆ เช่น ตรวจระดับโคเลสเตอรอลในเลือดของคุณ แพทย์ของคุณควรตรวจระดับโคเลสเตอรอลของคุณหลังจากเริ่มใช้ เซลเจนซ์เป็นเวลา 4 ถึง 8 สัปดาห์ และตามที่จำเป็นหลังจากนั้น เนื่องจากโคเลสเตอรอลสูงอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

แพทย์ของคุณยังอาจตรวจสอบผลการตรวจตับบางอย่างเป็นประจำ

ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในระหว่างการรักษาด้วย เซลเจนซ์

- หากมีอาการแพ้ เช่น แขนงหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด เวียนศีรษะรุนแรงหรือมึนงง ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอบวม อาการคันหรือผื่นผิวหนังเมื่อใช้ เซลเจนซ์ หรือหลังจากใช้ เซลเจนซ์ ไม่นาน โปรดแจ้งแพทย์ของคุณทันที
- หากมีอาการติดเชื้อใดๆ หรืออาการใดๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อ (ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) โปรดแจ้งแพทย์ของคุณทันทีที่คุณรู้สึกไม่สบาย เซลเจนซ์ อาจลดสมรรถภาพของร่างกายในการตอบสนองต่อการติดเชื้อ และอาจทำให้การติดเชื้อที่เป็นอยู่แย่ลงหรือเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อใหม่
- หากคุณรู้สึกปวดกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง
- หากผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีอาการคลื่นไส้ หรืออาเจียน
- หากมีอาการใดๆ ของโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ หรืออาการของการอักเสบของลำไส้ใหญ่ (ถุงลำไส้อักเสบ) เช่น มีไข้และปวดบริเวณกระเพาะอาหารหรือช่องท้อง หรือมีไข้และรูปแบบในการขับถ่ายเปลี่ยนไปอย่างอธิบายไม่ได้ โปรดแจ้งแพทย์ของคุณ ผู้ที่ใช้เซลเจนซ์ จำนวนน้อยมากเกิดการทะลุของกระเพาะอาหารหรือลำไส้ สภาวะนี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในผู้ที่

ได้รับยาแก้อักเสบที่มีใช้สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) หรือ คอร์ติโคสเตียรอยด์ (เช่น prednisone) ร่วมด้วย

- หากคุณเป็นมะเร็งชนิดใด ๆ เซลล์อาจเพิ่มความเสียหายของมะเร็งบางชนิดของคุณ เช่นเดียวกับยาอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน
- พบปฏิกิริยาการแพ้ เช่น angioedema และลมพิษในผู้ที่ใช้เซลล์ และหากมีปฏิกิริยาภาวะภูมิไวเกินร้ายแรงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้เซลล์ทันที
- จากข้อมูลการศึกษา ได้สังเกตพบภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดดำในผู้ป่วยที่ได้รับเซลล์ ในการศึกษาทางคลินิกและการรายงานหลังวางจำหน่าย ได้สังเกตพบการเกิดเหตุการณ์ลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดปอดเพิ่มขึ้นตามขนาดยาและได้สังเกตพบเหตุการณ์ลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดดำลึกในกลุ่มการรักษา
- หากมีอาการหลอดเลือดอักเสบ ข้ออักเสบติดเชื้อ กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบ ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
- ควรใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวังในการรักษาผู้ป่วยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันหรือเคยสูบบุหรี่มาก่อนเป็นระยะเวลาสั้น และในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ทางหลอดเลือดและหัวใจ
- ควรใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่ทราบว่ามียาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดกระดูกแตกหัก เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่เป็นสตรี และผู้ป่วยใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์

ผู้สูงอายุ

เนื่องจากประชากรสูงอายุมีอัตราการติดเชื้อสูงกว่า ผู้ป่วยอายุ 65 ปีขึ้นไปจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษขณะได้รับการรักษาด้วย เซลล์ โปรดแจ้งแพทย์ของคุณทันทีที่คุณสังเกตเห็นอาการจากการติดเชื้อใดๆ ควรประเมินปัจจัยเสี่ยงของภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดดำและผู้ป่วยที่มีประวัติของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งรวมถึงความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งในผู้ป่วยอายุ 65 ปีขึ้นไป ก่อนเริ่มการรักษาและระหว่างการรักษาเป็นระยะ

เด็กและวัยรุ่น

ห้ามให้ เซลล์ แก่เด็กหรือวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ยังไม่ได้มีรายงานความปลอดภัยและประโยชน์ของ เซลล์ ในเด็ก

สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมตนเอง คิดว่าอาจตั้งครรภ์ หรือกำลังวางแผนที่จะมีบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนเริ่มใช้ยานี้ สตรีที่มีโอกาสมีบุตรต้องให้การคุมกำเนิดที่มี

ประสิทธิผลในระหว่างการรักษา และใช้ต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 28 วันหลังจากหยุดการรักษาด้วย
เซลแจนซ์

ขณะที่ได้รับการรักษาด้วยเซลแจนซ์ อยู่ สตรีตั้งครรภ์ไม่ควรใช้ เซลแจนซ์ ต่อ

ไม่มีข้อมูลว่าพบเซลแจนซ์ ในน้ำนมหรือไม่ หากคุณอยู่ระหว่างการเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมตนเอง คุณ
ควรหยุดการให้นมบุตรหรือปรึกษากับแพทย์ของคุณเรื่องการหยุดการรักษาด้วยเซลแจนซ์

การขับขี้นานพาหะและควบคุมเครื่องจักรกล

เซลแจนซ์ไม่น่าจะส่งผลต่อความสามารถในการขับขี้นานพาหะหรือควบคุมเครื่องจักรของคุณ

เซลแจนซ์ มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม

ผลิตภัณฑ์ยานี้มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม หากแพทย์ของคุณแจ้งว่าคุณแพ้แอลกอฮอล์บางชนิด โปรด
ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนเริ่มใช้ เซลแจนซ์

16. เมื่อไรคุณควรปรึกษาแพทย์

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

17. วันที่แก้ไขปรับปรุงเอกสาร

15 กันยายน 2566