

**โมร็อกโทค็อกแอลฟา**  
**ความแรง 250, 500, 1000**  
**และ 2000 หน่วยสากล**  
**ชนิดผงพร้อมตัวทำละลายสำหรับฉีด**  
**ชื่อการค้า Xyntha™ (ซินธา™)**

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โม-ร็อก-โท-ค็อก-แอล-ฟา (moroctocog alfa) ความแรง 250, 500, 1000 หรือ 2000 หน่วยสากล
- เป็นยาในกลุ่ม โพรตีนช่วยการแข็งตัวของเลือด ชนิดแฟคเตอร์ 8

### 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาและป้องกันภาวะเลือดออกในผู้ป่วยโรคเลือดออกผิดปกติ (โรคฮีโมฟีเลีย) ชนิดเอ

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีประวัติแพ้โปรตีนจากหนูแฮมสเตอร์

### 2.2. ข้อควรระวัง

**เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**  
**หากท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- ต้องจำกัดปริมาณโซเดียมจากอาหาร
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร**  
**ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้ท่าน
- แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร จะสอนวิธีฉีดยาให้ก่อนเมื่อทำเป็นแล้วค่อยไปฉีดเองที่บ้าน
- ยานี้ใช้สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำเท่านั้น

### 3.2. หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ติดต่อแพทย์ทันที หากท่านลืมไปฉีดยาตามนัดหมาย

### 3.3. ถ้าสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาดควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้รับยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หากฉีดยาไปแล้วยังมีอาการเลือดออกอยู่ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1. อาการที่ต้องรีบแจ้งแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- ริมฝีปากและเหงือกมีสีคล้ำ

**“ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”**

### 5.2. อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามี

**อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- ปวดหัว ใจ มีไข้ ปวดข้อ
- ความอยากอาหารลดลง
- ท้องเสีย อาเจียน อ่อนเพลีย
- ปวด แดง คัน บริเวณที่ฉีดยา

**“ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- โดยทั่วไปยานี้จะถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับยานี้กลับบ้าน
- หากท่านต้องเก็บยานี้ด้วยตนเอง เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
- ห้ามเก็บยาและบรรจุภัณฑ์ในช่องแช่แข็ง
- ในกรณีที่เก็บยานอกตู้เย็น ยาจะมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่เอาออกจากตู้เย็น เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสง โดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียสไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- ยาที่ผสมน้ำเกลือแล้วให้ใช้ทันทีหรือภายใน 3 ชั่วโมง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** ในกล่องยา 1 กล่อง ประกอบด้วย
  1. ขวดแก้วบรรจุผงยา ผงสีขาวถึงสีขาวนวล
  2. น้ำเกลือสำหรับผสมยา
  3. ชุดอุปกรณ์สำหรับฉีดยาโดยแถบสีบนกล่องยาจะบอกความแรงของยา ดังนี้
  - แถบสีเหลือง ความแรง 250 หน่วยสากล
  - แถบสีฟ้า ความแรง 500 หน่วยสากล
  - แถบสีเขียว ความแรง 1000 หน่วยสากล
  - แถบสีแดง ความแรง 2000 หน่วยสากล
- **ตัวยาสําคัญ** คือ โมร็อกโทค็อกแอลฟา
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ ซูโครส, แคลเซียมคลอไรด์ ไดไฮเดรต, แอล-ฮิสทีดีน, โพลีซอร์เบต 80, โซเดียมคลอไรด์

ผู้ผลิต Wyeth Farma S.A. ประเทศสเปน  
ผู้นำเข้าบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 พฤษภาคม 2566  
**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**  
<https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>  
<https://ndi.fda.moph.go.th>

**ยานี้เป็นยาควบคุมพิเศษ การใช้ยามีความเสี่ยง**  
**ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น**