

อะโบรซิทีนิบ

ความแรง 50, 100 และ 200 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า CIBINQO™ (ซิบินโค™)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า อะโบรซิทีนิบ (Abrocitinib)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังตามคำวินิจฉัยของแพทย์ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ติดเชื้รุนแรง รวมถึงโรคผิวหนัง
- มีภาวะตับบกพร่องรุนแรง
- กำลังตั้งท้อง หรือให้นมลูก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีการติดเชื้อในกระแสเลือด
 - เคยเป็นโรคผิวหนัง
 - เคยเป็นโรคถุงสวัด
 - เคยเป็นโรคตับอักเสบ บี หรือ ซี
 - เพิ่งได้รับวัคซีน หรือมีแผนจะรับวัคซีน
 - เคยมีประวัติล้มเลือดอุดตันที่ขาหรือปอด
 - เป็นโรคมะเร็ง หรือเคยเป็นโรคมะเร็ง
 - มีแผนจะคุมกำเนิด
 - แพ้น้ำตาลแลคโตส
 - อายุ 65 ปีขึ้นไป
 - เคยเป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวหรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ (เช่น สูบบุหรี่)
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากกำลังใช้ยาอาหารเสริม หรือสมุนไพรอื่น ๆ อยู่ เพราะอาจส่งผลต่อการรักษาของยานี้
- ไม่ควรใช้ยาในผู้ที่อายุน้อยกว่า 12 ปี เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ

3. วิธีใช้ยา

3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ วันละ 1 ครั้ง
- สามารถกินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่หากเกิดอาการคลื่นไส้ ให้กินยานี้พร้อมอาหาร
- ห้ามหัก บด เคี้ยว หรือละลายยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าลืมเกิน 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อถัดไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและอันตรายจากยา
- ห้ามปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง และให้กินยานี้ต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีฝ้าตามผิวหนัง
 - ตุ่มพอง ปวดแสบร้อน ซึ่งอาจมีไข้ร่วมด้วย
 - ชาบวม เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก
- “ให้หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน
- เริ่มที่ริมฝีปาก
- ปวดท้อง
- ปวดหัว มึนงง
- สิว

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา มี 3 ความแรง ดังนี้
 - ความแรง 50 มิลลิกรัม: ลักษณะเม็ดยาเป็นวงรี สีชมพู มีอักษร PFE อีกด้านมีอักษร ABR 50
 - ความแรง 100 มิลลิกรัม: ลักษณะเม็ดยาเป็นเม็ดกลม สีชมพู มีอักษร PFE อีกด้านมีอักษร ABR 100
 - ความแรง 200 มิลลิกรัม: ลักษณะเม็ดยาเป็นวงรี สีชมพู มีอักษร PFE อีกด้านมีอักษร ABR 200
- ตัวยาสสำคัญ อะโบรซิทีนิบ 50, 100 และ 200 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส, โดเบสิกแคลเซียมฟอสเฟตแอนไฮไดรต์, โซเดียม สตาโรซโซลโคเลต, แมกนีเซียมสเตียเรต, ไฮโปรมีลโลส (E464), โทเทเนียมไดออกไซด์ (E171), แล็กโตสโมโนไฮเดรต, มาโครกอล, ไตรอะซีติน (E1518), ไอรอนเรดออกไซด์ (E172)

ผู้ผลิต Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH ประเทศเยอรมนี

ผู้นำเข้า บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx)

▪ <https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

▪ <https://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือน ยานี้เป็นยาควบคุมพิเศษ การใช้ยามีความเสี่ยง ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร