

ทาลาโซพาริบ ความแรง 0.25 และ 1 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูลแข็ง ชื่อการค้า TALZENNA (ทาลเซนนา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ทาลาโซพาริบ (talazoparib) เป็นยาในกลุ่มยา
รักษาโรคมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งเต้านมที่แพทย์ตรวจแล้วว่า
จำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับไต
 - หากท่านสามารถตั้งครรภ์ได้ บุคลากรทางการแพทย์
อาจทำการตรวจการตั้งครรภ์ ก่อนที่ท่านจะเริ่มการ
รักษาด้วยยานี้
- หญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์
ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ เพราะยาสามารถก่อให้เกิด
อันตรายต่อทารกในครรภ์และอาจทำให้แท้งได้
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงให้นมลูกหรือวางแผนที่จะให้
นมลูก
- ยานี้อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการเจริญพันธุ์ในเพศชาย ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการมีลูกได้ในเพศชาย
โปรดขอคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์หากท่านมี
ความกังวลในประเด็นนี้
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิด
อันตรายได้

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
หากไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความ
รุนแรงของโรค
- กินยานี้ วันละ 1 ครั้ง
- สามารถกินยานี้พร้อมหรือไม่พร้อมกับอาหารก็ได้
- กลืนยานี้ทั้งแคปซูล โปรดอย่าละลายหรือเปิดแคปซูลของ
ยานี้
- บุคลากรทางการแพทย์อาจเปลี่ยนขนาดยา หรือแจ้งท่านให้
หยุดใช้ยา โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าท่านตอบสนองต่อการรักษา
มากน้อยเพียงใด
- หากอาเจียนหลังกินยา อย่ากินยาเพิ่ม โปรดกินยาครั้งถัดไป
ตามเวลาปกติ

3.2 หากลืมหากินยาควรทำอย่างไร

- หากท่านลืมหากินยานี้ โปรดกินยาครั้งถัดไปตามเวลาปกติ
ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง
ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา
หรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเองและให้กินยาต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์
หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
เพราะยานี้อาจทำให้อ่อนล้า อ่อนเปลี้ย หรือมีแรง
- ควรทราบข้อมูลของยาและรายการยาที่ท่านใช้ เพื่อแสดงให้เห็น
บุคลากรทางการแพทย์และเภสัชกรดูในแต่ละครั้งที่รับยาใหม่
หากท่านไม่แน่ใจว่าได้รับยาเหล่านั้นอยู่ ให้ปรึกษาแพทย์
หรือเภสัชกร
- ท่านไม่ควรตั้งครรภ์ในระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยยานี้
- หญิงต้องคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้ และหลังจากหยุดยานี้
อย่างน้อย 7 เดือน
- ชายต้องคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้ และหลังจากหยุดยานี้
อย่างน้อย 4 เดือน
- โปรดแจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบในทันที หากท่าน
ตั้งครรภ์ หรือเกิดตั้งครรภ์ในระหว่างที่ได้รับยานี้
- หลีกเลี่ยงการให้นมลูกในระหว่างการใช้ยานี้ และนับไปอีก
อย่างน้อย 1 เดือน หลังการหยุดยา
- โปรดขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับ
วิธีการที่ดีที่สุดในการให้นมลูกของท่านในระหว่างช่วงเวลานี้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีน้ำตามผิวหนัง
- ไข้สูง หายใจสั้น หายใจลำบาก รู้สึกเหนื่อยล้า ผิวซีด หรือ
หัวใจเต้นเร็ว ปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือด จ้ำเลือด หรือ
เลือดออกเป็นระยะอย่างผิดปกติ
- จำนวนเม็ดเลือดผิดปกติเนื่องจากไขกระดูกมีปัญหารุนแรง
"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ไม่ยอมอาหาร ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ผม่ว
ปวดศีรษะ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควร
เก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาใน
ที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา มี 2 ความแรง ดังนี้
 - ความแรง 0.25 มิลลิกรัม: แคปซูลชนิดแข็ง ปลูก
แคปซูลสีขาวขุ่น (พิมพ์ "Pfizer" สีดำ) และตัวแคปซูล
สีขาว (พิมพ์ "TLZ 0.25" สีดำ)
 - ความแรง 1 มิลลิกรัม: แคปซูลชนิดแข็ง ปลูกแคปซูลสี
แดงอ่อน (พิมพ์ "Pfizer" สีดำ) และตัวแคปซูลสีขาว (พิมพ์
"TLZ 1" สีดำ)
 - ตัวยาสสำคัญ ทาลาโซพาริบ ทอซีเลท 0.25 และ
1 มิลลิกรัม
 - ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ซิลิซิไฟด์ไมโครคริสตัลไลน์
เซลลูโลส (silicified microcrystalline cellulose (sMCC))
- ผู้ผลิต Excella GmbH & Co. KG ประเทศเยอรมนี
ผู้รับอนุญาต บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
กรุงเทพมหานคร
- เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2569
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
ความแรง 0.25 มิลลิกรัม: <https://www.pfi.sr/6415094>
ความแรง 1 มิลลิกรัม: <https://www.pfi.sr/6415095>



PIL Revision no.: 2.1 PIL date: March 16, 2026 Country: Thailand