



เอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วย

ยาเม็ดวีเฟนด์™ (Vfend™) 50 และ 200 มิลลิกรัม โวริโคนาโซล (Voriconazole)

โปรดอ่านเอกสารนี้ให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนเริ่มรับประทานยา

- เอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยนี้รวบรวมข้อมูลสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยานี้
ไม่ได้มีข้อมูลยาครบถ้วนหรือทดแทนการดูแลโดยแพทย์หรือเภสัชกร
หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม หรือเกิดอาการข้างเคียง
รวมถึงอาการข้างเคียงนอกเหนือจากเอกสารนี้ หรือมีอาการรุนแรงหรือร้ายแรงขึ้น
โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ให้ใช้สำหรับคุณเท่านั้น ห้ามให้ยานี้แก่ผู้อื่นเพราะอาจเป็นอันตรายได้

This leaflet answers some common questions about this medicine. It does not contain complete drug information and cannot substitute for professional care. If you have any questions or suspect that you have adverse drug reactions, please contact your pharmacist or physician.

This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others because it may harm them.

1. ยาเม็ดวีเฟนด์คือยาอะไร และใช้รักษาในกรณีใด

ยาเม็ดวีเฟนด์เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสำหรับรักษาการติดเชื้อราที่ไวต่อยานี้ ใน 1

เม็ดมีตัวยาสำคัญคือ โวริโคนาโซล 50 หรือ 200 มิลลิกรัม มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อรา เช่น

- การติดเชื้อราชนิดแอสเพอร์จิลลัสแบบลุกลาม หรือ
- การติดเชื้อราชนิดแคนดิดาในเลือดแบบลุกลามชนิดร้ายแรง หรือ
- การติดเชื้อราชนิดแคนดิดาที่หลุดอาหาร หรือ
- การติดเชื้อราชนิดแคนดิดาในเลือดในผู้ป่วยบางกลุ่ม หรือ
- การติดเชื้อราชนิดร้ายแรงอื่น ๆ

ในผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถทนต่อการรักษาหรือต้องต่อการรักษาด้วยยาอื่น

ใช้ป้องกันการติดเชื้อราในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (ได้แก่ ผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกบางกลุ่ม ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งกลับเป็นซ้ำ เป็นต้น) ซึ่งมีใช้

ป้องกันการติดเชื้อราในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อราแบบลุกลาม เช่น ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

2. ก่อนรับประทานยาวิเฟนดี

ห้ามรับประทานยาวิเฟนดีในกรณีต่อไปนี้

แพ้ยา โวริโคนาโซล หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในยาเม็ดวิเฟนดี เช่น น้ำตาลแลคโตส หรือ แป้งบางชนิด แมกนีเซียม สเตียเรต เป็นต้น หรือ แพ้อื่นในกลุ่ม azole (เช่น คีโตโคนาโซล ฟลูโคนาโซล เป็นต้น)

ข้อควรระมัดระวังสำหรับการรับประทานยาวิเฟนดี

เพื่อให้แพทย์ได้พิจารณาการสั่งยาให้เหมาะกับคุณ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณ

- มีโรคเกี่ยวกับตับอยู่ก่อนหรือกำลังเป็นโรคเกี่ยวกับตับ
- มีอาการหอบ หรือ ผื่นแพ้อยู่ก่อน
- กำลังมีครรภ์หรือคาดว่าจะมีครรภ์ หรือวางแผนจะมีครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- มีประวัติเป็นโรคหัวใจ

ข้อควรระวังเป็นพิเศษในการใช้ยาวิเฟนดี

- ระหว่างการรักษาด้วยยาวิเฟนดี
ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังชนิดรุนแรง เช่น กลุ่มอาการ Stevens-Johnson (SJS), Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) และ ปฏิกิริยาจากยาร่วมกับภาวะที่มีเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิลในเลือดสูงและอาการต่าง ๆ ของระบบร่างกาย (กลุ่มอาการ DRESS)
- สังเกตพบความเสี่ยงที่สูงขึ้นของการเกิดพิษที่ผิวหนังจากการใช้ยาร่วมกับ methotrexate ซึ่งเป็นยาที่เกี่ยวข้องกับการกำเริบซ้ำของโรคเนื่องมาจากการสัมผัสแสง UV แนะนำให้ผู้ป่วย รวมถึงผู้ป่วยเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรงในระหว่างการรักษาด้วยวิเฟนดี และใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น สวมเสื้อผ้ากันแดดและใช้ครีมกันแดดที่มีค่าการป้องกันแสงแดด (SPF) สูง

- ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาระยะยาวด้วยยาวิเฟน็ดและคอร์ติโคสเตียรอยด์ (รวมทั้งคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดพ่นสูด เช่น budesonide) ควรได้รับการตรวจติดตามความผิดปกติของต่อมหมวกไตชั้นนอกอย่างใกล้ชิด ทั้งระหว่างการรักษาและหลังจากหยุดใช้ยาวิเฟน็ด
- ผู้ป่วยควรได้รับคำแนะนำในการดูแลทางการแพทย์ในทันทีหากผู้ป่วยมีอาการแสดงและอาการของ Cushing's syndrome หรือภาวะต่อมหมวกไตบกพร่อง

การรับประทานยาอื่นร่วมกับยาวิเฟน็ด

ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งหากคุณเพิ่งใช้หรือกำลังใช้ยาอื่น ๆ ร่วมด้วย แม้จะไม่ใช่ยาที่ได้สั่งโดยแพทย์ก็ตาม เนื่องจากยาอาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันได้

ยาที่อาจถูกรบกวนจากการใช้ยาวิเฟน็ด หรืออาจส่งผลต่อการทำงานของยาวิเฟน็ด

ส่วนใหญ่เป็นยาที่มีการทำลายยาผ่านตับด้วยระบบการทำลายยาเดียวกับไวรัสโคโรนาซอล

แม้ว่าบางตัวอาจยังไม่มีผลยืนยันจากการศึกษาทางคลินิก* ยาเหล่านี้ได้แก่

- | | |
|--|--|
| - ยาแก้แพ้เทอร์เฟนาดีน (terfenadine),
แอสทีไมโซล (astemizole) | - ยาลดกรดบางชนิด เช่น โอมิพราโซล (omeprazole) |
| - ยาที่ใช้หลังการผ่าตัดเปลี่ยนไตบางชนิด เช่น ไสโคลสปอริน (cyclosporine), sirolimus, tacrolimus | - ยาด้านอาการชักชนิดฟีนัยโตอิน (phenytoin), คาร์บามาเซพีน (carbamazepine) |
| - ยาปฏิชีวนะหรือยารักษาการติดเชื้อ เช่น อีริโทรมัยซิน (erythromycin), ควินิดีน (quinidine), ไรแฟมพิซิน (rifampicin), ไรฟาบูติน (rifabutin), ฟลูคลอกซาซิลลิน (flucloxacillin) | - ยาด้านไวรัสเอชไอวีบางตัวหรือบางขนาด ใช้ยา เช่น เอฟาไวเรนซ์ (efavirenz), ริโทนาเวียร์ (ritonavir), อินดีนาเวียร์ (indinavir)*, ซาคควินาเวียร์ (saquinavir)*, เนลฟินาเวียร์ (nelfinavir)*, เดลลาเวอร์ดีน (delavirdine)*, เนวีราพีน (nevirapine)* |
| - ยาด้านการจับตัวของเลือด เช่น วาร์ฟาริน(warfarin) | |
| - ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดกลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย* เช่น ไกลปิซายด์ (glipizide), ไกลบูรายด์ (glyburide), โทลบูทามายด์ (tolbutamide), | - ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
- กลุ่มเบนโซไดอะซีปีนส์* เช่น midazolam, alprazolam, triazolam |

- ยาระบาย เช่น นาโลเซกอล (naloxegol)
 - ยารักษา cystic fibrosis เช่น ไอวาคาฟเตอร์ (Ivacaftor)
 - ยาประเภทอัลคาลอยด์บางชนิด เช่น vincristine*, vinblastine*, ergotamine, dihydroergotamine เป็นต้น
 - ยาที่มีผลต่อหัวใจ เช่น ไอวาบราดีน (ivabradine)
 - ยารักษาโรคมะเร็ง เช่น เวเนโตแคลกซ์ (venetoclax), กลาสเดกิบ (glasdegib)
 - ยารักษาโรคซึมเศร้า เช่น เซนต์จอห์นเวิร์ต (St John's Wort)
 - ยารักษาอาการนอนไม่หลับ เช่น เอสโซพิโคลน (eszopiclone)
 - ยาควบคุมภูมิคุ้มกัน เช่น อีเวโรลิมุส (everolimus)
 - ยากลุ่มกรดวิตามินเอ เช่น เตรติโนอิน (tretinoin)
 - ยากลุ่ม CYP3A4 substrate เช่น เลมโบรีแซนท (Lemborexant), ฟิเนเรนอน (finerenone)
- และ
- ยาเมธาโดน (methadone)
 - ลูราซิโดน (lurasidone)
 - ยาลดระดับไขมันในเลือดกลุ่มสตาติน* เช่น โลวาสตาติน (lovastatin)
 - ยาป้องกันการติดเชื้อไวรัส CMV เช่น ลีเทอร์โมเวียร์ (Letermovir)
 - ยารักษาอาการระดับโซเดียมในเลือดต่ำ เช่น โทลแวปแทน (Tolvaptan)
 - ยากลุ่ม tyrosine kinase inhibitors เช่น axitinib, bosutinib, cabozantinib, ceritinib, cobimetinib, dabrafenib, dasatinib, nilotinib, sunitinib, ibrutinib, ribociclib

ยาเหล่านี้บางรายการหากจำเป็นต้องใช้ร่วมกับยาเม็ดตีเฟนด์อาจต้องปรับขนาดให้ยาให้เหมาะสม โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาขนาดให้ยาที่เหมาะสมกับคุณ

หญิงมีครรภ์

หากคุณกำลังมีครรภ์หรือคิดว่าอาจตั้งครรภ์

ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนรับประทานยาเม็ดตีเฟนด์หรือยาอื่น ๆ เสมอ กรณีที่คุณมีโอกาสตั้งครรภ์และหากแพทย์เห็นว่าคุณมีความจำเป็นต้องรับประทานยาเม็ดตีเฟนด์ ควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพเพิ่มเติมระหว่างการรับประทานยาเม็ดตีเฟนด์ด้วย

หญิงให้นมบุตร

ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในหญิงให้นมบุตร

แพทย์อาจพิจารณาให้ยาวีเฟนดีในหญิงให้นมบุตรหากมีความจำเป็น

เฉพาะเมื่อคาดว่าจะได้รับผลดีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดกับบุตร

ความสามารถในการขับขี้นานพาหะและควบคุมเครื่องจักรกล

ยาเม็ดวีเฟนดีอาจทำให้การมองเห็นไปจากปกติชั่วคราว เช่น ตามัว สู้แสงไม่ได้

ดังนั้นระหว่างการรับประทานยาเม็ดวีเฟนดี

คุณต้องหลีกเลี่ยงการขับขี้นานพาหะหรือควบคุมเครื่องจักรกลในระหว่างที่มีอาการเหล่านี้

โดยเฉพาะไม่ควรขับรถตอนกลางคืนในช่วงที่รับประทานยาเม็ดวีเฟนดีอยู่

3. วิธีการรับประทานยาเม็ดวีเฟนดี

ขนาดยาวีเฟนดีที่รับประทานขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อและน้ำหนักตัวของคุณ

ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ควรรับประทานยาวีเฟนดี 1

ชั่วโมงก่อนหรือหลังอาหาร

ขนาดยาที่แนะนำของยาเม็ดวีเฟนดีเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยทั่วไปสำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป,

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป เป็นดังนี้ คือครั้งละ 200 มิลลิกรัม ทุก 12

ชั่วโมง ต่อเนื่องไปในระยะเวลาตามแพทย์สั่ง

ถ้าการตอบสนองของผู้ป่วยยังไม่เพียงพออาจเพิ่มขนาดรับประทานอย่างต่อเนื่องจาก 200 มิลลิกรัมทุก

12 ชม. เป็น 300 มิลลิกรัมทุก 12 ชม.

หากคุณมีน้ำหนักน้อยกว่า 40 กิโลกรัม แพทย์อาจปรับลดขนาดยาลงครั้งหนึ่งเป็น 100 มิลลิกรัมทุก 12

ชม. แต่หากมีการตอบสนองต่อการรักษาไม่เพียงพอ แพทย์สามารถเพิ่มขนาดยาเป็น 150 มิลลิกรัมทุก

12 ชม.

ในผู้ป่วยโรคตับเฉียบพลันซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของเอ็นไซม์ที่แสดงถึงการทำงานของตับ

ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา แต่ควรมีการติดตามการทำงานของตับเป็นระยะ

ในผู้ป่วยโรคตับแข็งเล็กน้อยถึงปานกลางควรลดขนาดยาที่ให้ต่อเนื่องลงครั้งหนึ่ง

ยังไม่มีการศึกษาการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับแข็งรุนแรง

ขนาดยาที่แนะนำของยาวิเฟนดเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยทั่วไปสำหรับเด็ก (อายุ 2 ถึงน้อยกว่า 12ปี) ที่กลืนยาทั้งเม็ดได้ และวัยรุ่น อายุ 12-14 ปีที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 50 กก. คือ 9 มิลลิกรัม/กก. วันละ 2 ครั้ง แพทย์อาจปรับเปลี่ยนขนาดรับประทานสูงสุดเป็น 350 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง

หากคุณรับประทานยาเม็ดวิเฟนดมากกว่าที่แพทย์สั่ง

ในกรณีที่มีการรับประทานยาเม็ดวิเฟนดเกินขนาด

ควรไปพบแพทย์โดยทันทีและนำยาที่เหลือหรือกล่องยาไปด้วย แม้ว่าจะมียาเหลืออยู่หรือไม่ก็ตาม อย่ารับประทานยาต่อจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์

หากคุณลืมนรับประทานยาเม็ดวิเฟนด

หากคุณลืมนรับประทานยาเม็ดวิเฟนดให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ใน 2 ถึง 3 ชั่วโมงหลังจากมื้อยาที่ลืมนรับประทาน แต่หากนึกได้ใกล้เวลารับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่ต้องรับประทานยาทดแทนมื้อที่ลืมนแต่ให้รับประทานยามื้อถัดไปนั้นให้ตรงเวลา ห้ามรับประทานยาเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อทดแทนการลืมนรับประทานยาในมื้อที่ผ่านมา

การหยุดยารับประทานยาเม็ดวิเฟนด

หากคุณหยุดรับประทานยาเม็ดวิเฟนดก่อนที่แพทย์กำหนดเชื้ออาจกำเริบขึ้นมาใหม่ได้ คุณอาจมีอาการแสบ หรือกลับมาป่วยจากการติดเชื้อใหม่อีก อย่าหยุดรับประทานยาเอง ควรรับประทานยาเม็ดวิเฟนดให้ครบตามที่แพทย์สั่งถึงแม้ว่าคุณจะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

เช่นเดียวกับยาทุกชนิด ยาเม็ดวิเฟนดทำให้เกิดผลข้างเคียงในบางคนได้ ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยมาก ได้แก่ การมองเห็นบกพร่อง, ไข้, บวมตามปลายมือปลายเท้า, คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดท้อง, ท้องเสีย, ปวดศีรษะ, มีผื่นที่ผิวหนังคล้ายโรคหัดอย่างอ่อนถึงปานกลางตามร่างกายทั่วไป เป็นต้น

ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที **ถ้าคุณมีอาการต่อไปนี้หลังจากรับประทานยา**

- ปฏิกริยาการแพ้อย่างรุนแรง เช่น หายใจเสียงดังวิตกระทันหัน หายใจลำบาก บวมที่หนังตา หน้า หรือริมฝีปาก มีผื่นแดงหรือคัน
- มีตุ่มพองที่ผิวหนัง หรือผิวหนังลอกเป็นบริเวณกว้าง มีไข้ ไข้ รู้สึกไม่สบาย หรือ เหนื่อย, ลึนหรือริมฝีปากบวม
- ตาขาวและผิวเป็นสีเหลือง (ดีซ่าน)

- หัวใจเต้นผิดจังหวะ

5. คำแนะนำในการเก็บยาวิเฟนด

ควรเก็บยาไว้ในแผงจนกว่าจะถึงเวลารับประทานยา

ควรเก็บยาไว้ในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส และเก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามใช้ยาหลังวันสิ้นอายุของยาที่แสดงไว้บนฉลาก หากไม่ระบุเป็นอย่างอื่น วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนที่แสดงบนฉลาก

ข้อมูลในเอกสารกำกับยานี้เป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับยาเม็ดเคลือบฟิล์มวิเฟนดเท่านั้น

6. ชื่อผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด