

# ทาลาโซพาริบ ความแรง 0.25 และ 1 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูลแข็ง ชื่อการค้า TALZENNA (ทาลเซนนา)

## 1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า ทาลาโซพาริบ (talazoparib) เป็นยาในกลุ่มยา  
รักษาโรคมะเร็ง
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้เพื่อรักษา โรคมะเร็งเต้านมที่แพทย์ตรวจแล้วว่า  
จำเป็นต้องใช้ยานี้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
    - หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับไต
    - หากท่านสามารถตั้งครรภ์ได้ บุคลากรทางการแพทย์  
อาจทำการตรวจการตั้งครรภ์ ก่อนที่ท่านจะเริ่มการ  
รักษาด้วยยานี้
  - หญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์  
ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ เพราะยาสามารถก่อให้เกิด  
อันตรายต่อทารกในครรภ์และอาจทำให้แท้งได้
  - ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงให้นมลูกหรือวางแผนที่จะให้  
นมลูก
  - ยานี้อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการเจริญพันธุ์ในเพศชาย ซึ่ง  
อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการมีลูกได้ในเพศชาย  
โปรดขอคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์หากท่านมี  
ความกังวลในประเด็นนี้
  - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์  
เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิด  
อันตรายได้

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้  
หากไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่

คำเตือน: ยานี้ อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้  
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

## 3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น  
เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความ  
รุนแรงของโรค
  - กินยานี้ วันละ 1 ครั้ง
  - สามารถกินยานี้พร้อมหรือไม่พร้อมกับอาหารก็ได้
  - กลืนยานี้ทั้งแคปซูล ปรอดอย่าละลายหรือเปิดแคปซูลของ  
ยานี้
  - บุคลากรทางการแพทย์อาจเปลี่ยนขนาดยา หรือแจ้งท่านให้  
หยุดใช้ยา โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าท่านตอบสนองต่อการรักษา  
มากน้อยเพียงใด
  - หากอาเจียนหลังกินยา อย่ากินยาเพิ่ม โปรดกินยาครั้งถัดไป  
ตามเวลาปกติ
- 3.2 หากลืมหากินยาควรทำอย่างไร**
- หากท่านลืมหากินยานี้ โปรดกินยาครั้งถัดไปตามเวลาปกติ  
ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง  
ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา  
หรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเองและให้กินยาต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์  
หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล  
เพราะยานี้อาจทำให้อ่อนล้า อ่อนเปลี้ย หรือมีมึนงง
- ควรทราบข้อมูลของยาและรายการยาที่ท่านใช้ เพื่อแสดงให้  
บุคลากรทางการแพทย์และเภสัชกรดูในแต่ละครั้งที่รับยาใหม่  
หากท่านไม่แน่ใจว่าได้รับยาเหล่านั้นอยู่ ให้ปรึกษาแพทย์  
หรือเภสัชกร
- ท่านไม่ควรตั้งครรภ์ในระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยยานี้
- หญิงต้องคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้ และหลังจากหยุดยานี้  
อย่างน้อย 7 เดือน
- ชายต้องคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้ และหลังจากหยุดยานี้  
อย่างน้อย 4 เดือน
- โปรดแจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบในทันที หากท่าน  
ตั้งครรภ์ หรือเกิดตั้งครรภ์ในระหว่างที่ได้รับยานี้
- หลีกเลี่ยงการให้นมลูกในระหว่างการใช้ยานี้ และนับไปอีก  
อย่างน้อย 1 เดือน หลังการหยุดยา
- โปรดขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับ  
วิธีการที่ดีที่สุดในการให้นมลูกของท่านในระหว่างช่วงเวลานี้

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
  - ไข้สูง หายใจสั้น หายใจลำบาก รู้สึกเหนื่อยล้า ผื่นขีด หรือ  
หัวใจเต้นเร็ว ปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือด จ้ำเลือด หรือ  
เลือดออกเป็นระยะอย่างผิดปกติ
  - จำนวนเม็ดเลือดผิดปกติเนื่องจากไขกระดูกมีปัญหารุนแรง  
“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”
- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง  
ให้ไปพบแพทย์**
- ไม่อยากอาหาร ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ผม่ว  
ปวดศีรษะ

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควร  
เก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาใน  
ที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา มี 2 ความแรง ดังนี้
    - ความแรง 0.25 มิลลิกรัม: แคปซูลชนิดแข็ง ปลูก  
แคปซูลสีขาวขุ่น (พิมพ์ “Pfizer” สีดำ) และตัวแคปซูล  
สีขาว (พิมพ์ “TLZ 0.25” สีดำ)
    - ความแรง 1 มิลลิกรัม: แคปซูลชนิดแข็ง ปลูกแคปซูลสี  
แดงอ่อน (พิมพ์ “Pfizer” สีดำ) และตัวแคปซูลสีขาว (พิมพ์  
“TLZ 1” สีดำ)
  - ตัวยาสำคัญ ทาลาโซพาริบ ทอซีเลท 0.25 และ  
1 มิลลิกรัม
  - ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ซิลิซิไฟด์ไมโครคริสตัลไลน์  
เซลลูโลส (silicified microcrystalline cellulose (SMCC))
- ผู้ผลิต Pfizer Manufacturing Belgium NV ประเทศเบลเยียม  
ผู้รับอนุญาต บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
กรุงเทพมหานคร  
ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด  
กรุงเทพมหานคร
- เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2567  
**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**
- https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx
  - https://ndi.fda.moph.go.th/