

ลอร์ลาทีนิบ ความแรง 25 และ 100 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ชื่อการค้า LORVIQUA™ (ลอร์วิควา™)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ลอร์ลาทีนิบ (lorlatinib)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งปอดที่มีการแพร่กระจายในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ไม่เคยได้รับยาหรือเคยได้รับยาอื่นในกลุ่มเดียวกันมาก่อน ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
 - ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับ ไรแฟมพิซิน คาร์บามาเซพีน เฟนิโทอิน เอนซาลูตาไมด์ ไมโทเทน สมุนไพรรเซนดัจจอร์นเวรีท
- “หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”**

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีคอเลสแตอรอล หรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง
 - แพทย์แจ้งว่ามีอะไมเลสหรือไลเปสในเลือดสูง
 - เคยกินยานี้แล้วมีอาการเจ็บหน้าอก หายใจลำบาก ไอทั้งแบบมีเสมหะและไม่มีเสมหะ
 - กำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก
 - กำลังใช้ยาอื่น อาหารเสริม หรือสมุนไพรอยู่
 - มีปัญหาเกี่ยวกับไต

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
- ควรกินยาเวลาเดิมทุกวัน
- ให้กินยาทั้งเม็ด **ห้าม** เคี้ยว บด หรือ แบ่งเม็ดยา
- อย่ากินยานี้ หากเม็ดยาหัก แตก หรือไม่สมบูรณ์
- หากอาเจียนหลังกินยา อย่า กินยาเพิ่ม ให้รอกินยาครั้งถัดไปตามปกติ

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาครั้งถัดไป ให้รอกินยามือถัดไปตามปกติ ห้ามเพิ่มยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที และนำกล่องยาไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เพราะยานี้อาจมีผลต่อจิตใจทำให้ความคมเครื่องจักรไต่ลดลง
- หลีกเลี่ยงการให้นมลูกในระหว่างการใช้ยานี้ และนับไปอีกอย่างน้อย 7 วัน หลังการหยุดยา
- หญิงต้องคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้และหลังจากหยุดยาน้อยอย่างน้อย 35 วัน ชายต้องคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้ และหลังจากหยุดยาน้อยอย่างน้อย 98 วัน เพราะ ยานี้ อาจเป็นอันตรายต่อทารก
- ให้คุมกำเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัย เพราะยานี้ทำให้ยาคุมกำเนิดชนิดกินและฉีดได้ผลลดลง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- หัวใจเต้นช้าหรือเร็วผิดปกติ ปวดหัว เวียนหัว หายใจถี่ พูดลำบาก พูดซ้ำ
- ซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด ก้าวร้าว วิตกกังวล สับสน หลงลืม มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิต สูญเสียการติดต่อกับความเป็นจริง เช่น มีความเชื่อเห็น ไตยีน ในสิ่งที่ไม่ได้อยู่จริง
- ปวดท้อง ปวดหลัง ตัวเหลือง ตาเหลือง
- บั๊สสาวะสีเข้ม คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
- ไอ เจ็บหน้าอก มีปัญหาในการหายใจ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- แขนขาบวม เป็นเหน็บชา ท้องเสีย ท้องผูก
- นำหนักขึ้น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** มี 2 ความแรง ดังนี้
 - ความแรง 25 มิลลิกรัม: เม็ดเคลือบฟิล์มสีชมพูอ่อนกลม ด้านหนึ่งมีอักษร "Pfizer" อีกด้านหนึ่งมีอักษร "25" และ "LLN"
 - ความแรง 100 มิลลิกรัม: เม็ดเคลือบฟิล์มสีชมพูเข้มรูปไข่ ด้านหนึ่งมีอักษร "Pfizer" อีกด้านหนึ่งมีอักษร "LLN 100"
- **ตัวยาสำคัญ** ลอร์ลาทีนิบ 25 และ 100 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส (microcrystalline cellulose), แคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (calcium hydrogen phosphate), โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต (sodium starch glycolate), แมกนีเซียมสเตียเรต (magnesium stearate)

ผู้ผลิต Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH ประเทศเยอรมนี

ผู้รับอนุญาต บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ เมษายน 2566

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <https://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**คำเตือน: ยานี้ อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น**